

PAVLI CHRIST. FRID. WERNERI  
VERMIVM INTESTINALIVM  
BREVIS EXPOSITIONIS  
CONTINVATIO  
TERTIA

AVCTORE

IOHANNE LEONHARDO FISCHERO

PHILOS. ET ART. LIBERAL. MAGIST. MEDICINAE  
BACCALAVR. ET IN THEATR. ANATOM. LIPS.

PROSECTORE

---

CVM TABVLIS QVINQVE

AD NATVRAM PICTIS.

---

L I P S I A E

APVD SIEGER. LEBRECHT CRVSIVM  
MDCCC LXXXVIII.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

OF THE

CITY OF CHICAGO

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

R53087



## PRAEFATIO.

**E**quidem non habeo, quae cum lectoribus  
praefatione hac communicare possim,  
nisi forte hoc, quod continuationi huic disser-  
tationem \*) inseruerim, quam anno superiore  
pro iuribus magisterii in hac alma litterarum  
matre obtinendis publice defendi, quamquam  
bene noram, vermis intestinalis accessorii histo-  
riam quae nunc exponitur, huc proprie non  
pertinere. Sed nomen de exponenda oestri  
historia contractum dissoluendum erat: et cum  
illud in huius libri continuatione priori contra-  
xissem, videbatur quoque hic ipse locus maxime  
opportunos, ubi illud iterum dissolvere possem.

Spero

\*) Observationes de Oestro ovino atque bovino factae.  
Disputatio, Lipsiae MDCCCLXXXVII.

Spero igitur, fore, vt hoc mihi condonem  
 lectores, praecipue vbi cogitauerint, mihi  
 vel inuito ab auctore beato suppeditatam esse  
 huius argumenti tractandi occasionem. Caete-  
 rum vt obseruationes in finnis factae VIRI CELE-  
 BERRIMI GOETZIVS atque FABRICIVS bene-  
 vole et humaniter excipiant, etiam atque etiam  
 peto. Lipsiae MDCCCLXXXVIII.

---



## PROEMLIVM.

**Q**uantopere nostra aetas praeteritas diligentissima  
eademque accuratissima vel subtilissimarum,  
ae naturam spectant, rerum antecellat et quantum  
naturam rerum indagandi studium, quo plurimi  
strum tenentur, quislibet, vel is, qui libros nostri  
eculi vel fugitiuis oculis cum prioribus comparauerit,  
rspiciet. Inde factum est, vt isti in detrimentum  
conomiae animalis per longum temporis spatium  
glectae vermium historiae clarior sit adfusa lux et  
n exteri, quam ciues, omnes acuminis sui vires  
ic naturae parti intendant. Et si difficultates, qui-  
s huius naturae partis indagatio impeditur et tene-  
is, quibus per plura saecula fuit veluti obuelata,  
spexeris, erit, quod mireris, per haec obstacula  
nen tantos in hac naturae parte accuratius indaganda  
ogressus esse factos. Nam sane nostra aetas hanc  
i laudem merito sumit, quod viam tantis obseptam  
ficultatibus planiorem reddidit, et varia erroris prae-  
itia, in quae incautus naturae scrutator facile inci-  
re poterat, detexit. Vereor, ne nimis longus sim,  
A si

si huius naturae partis historiam inde ab initio accuratissime persequi velim; haec igitur pauca tantum, quae ad rem, a me propositam, spectant, decerpere decerptaque Lectoribus offerre mihi liceat.

Prius, quam litterae apud Graecos, Romanos et Arabes florere coeperint, nomen intestinorum vermium vix iis erat notum, et vel tunc temporis, cum animalium historia apud istos maxime culta floreret, omnis eorum de animalibus, in interioribus animalium partibus viventibus cognitio in eo erat posita, ut varias horum animalium species nouerint, notasque nominibus insignirent, interioriorem vero naturam animalemque oeconomiam ignorarent.

Apud GRAECOS e. g. Ασπερίδες, ROMANOS *Astarrides* et ARABES *vermes parui et graciles* occurrunt; porro apud GRAECOS Ἑλμίνθες στρογγύλης, ROMANOS *lumbricos teretes* et ARABES *Teretes* inuenies; denique apud ILLOS Ἑλμίνθες πλατείας, quos ROMANI *Taenias*, et ARABES *latos et cucurbitinos* nominauerant. Caeteri vermes intestinales in *Arabum* notitiam non venerunt. Cum eorum libros legeris non nunquam quidem plures vermium species inuenies; sed hae ab interpretibus originem ducunt suam qui interdum ob ambiguam et obscuram descriptionem ex vna plures finxere species. Quae cum ita sint haud iniqui erimus, vbi horum hospitorum interni notitiam apud *Graecos* et *Romanos* aequè mancam ac apud *Arabes* fuisse, nec nisi haec tria genera comprehendisse statuimus. Sed ponamus etiam, primo intuitu



intuitu vestigia vermium aliorum in illorum scriptis  
 inueniri, accuratiori eorum examine instituto, priores  
 se deprehendes et ab iis variata tantum descriptione,  
 non vero ipsa natura ac indole distingui. Ita fere  
 comparata erat omnis de vermibus intestinalibus cogni-  
 tio, cum apud illos populos, qui in litteris excolen-  
 tis facile principatum tenuere, litterae maxime flo-  
 rent. Cum vero omnia peius ruerent atque crassa  
 ignorantiae caligo omnium fere animos tegeret, mul-  
 tum abfuit, ut in interiora penetraretur, ut potius et  
 , quod detectum iam erat, cum interitu litterarum  
 iam paene periret. Quo in statu per plura saecula  
 nec de hisce vermibus scientia rudis et inpolita mane-  
 bat ita, ut nullius attentionem excitaret. Et si sequen-  
 tibus saeculis vir eximiis ingenii viribus instructus,  
 horum numerus tunc temporis admodum rarus erat,  
 hac scientiae parte quid tentare vellet, tantae eum  
 oppediebant difficultates, ut, nisi de felici laborum  
 excessu omnino desperare deberet, tamen non mul-  
 tum utilitatis in accuratiorem horum vermium cogni-  
 tionem redundaret. Quam ob rem missos faciam  
 omnes illos horum temporum viros, qui in suis scriptis  
 inde horum vermium mentionem iniecerunt, cum  
 se nomina eorum tantum et rudem figurae exhibue-  
 rat descriptionem, alto de interiori eorum structura,  
 et origine, totaque oeconomia silentio obseruato.  
 etior vero huic doctrinae lux adfulgebat, cum  
 ea medium saeculi praeteriti *Franciscus Redi* cele-  
 brimus inter Italos naturae scrutator scripto

edito <sup>a)</sup>), vt in conciuium fuorum notitiam hi vermes venirent, omnibus eniteretur viribus. Sed nec poterat tantum tanti viri nomen huic scrutationi animalium noſtra attentione variis de cauſis maxime dignae, multos conciliare amatores. Nec, qui eum a ciuibus ſuis ſequebantur, feliciori gaudebant ſucceſſu. Praeter *Redium* liceat aliorum eruditorum nomina excitare, qui poſtea huius ſcientiae fines in illis vermibus deſcribendis, inque familias redigendis tempus ſtudiumque conſecrarunt ſuum. *Nicol. ANDRY, Carol. BONNETVM, Steph. COVLETVM, Carol. DIONIS, van DOEVEREN, Sam. ERNESTVM, Guil. FABRICIVM, Carl. Frider. KALTSCHMIDTIVM, Iohann. Hieron. KNEIPHOFFIVM, Chriſtian. Gottl. KRATZENSTEINIVM, Carol. LINNAEVVM, Gottl. Polyc. SCHACHERVM*, vt reliquos taceam. Omnes vero longe antecelluit Celeberr. *Pallas*, a quo octoginta annis poſt *Redium* prima quaſi vermium inteſtinalium hiftoriae periodus initum cepit. Huius enim ex diſſertatione <sup>b)</sup> eruditi diſcebant, hanc hiftoriam accuratiori diſquiſitione non indignam, nec ad vſum plane eſſe inutilem. Et cum indagandi ſtudium variis rebus apud plures gentes accenſum, ad altiora adſpiraret, non erit, quod mireris, viros eximii ingenii omnes acuminis neruos huic excolendae doctrinae dicaffe.

Ne-

a) Vide eius *Degli animali viuente negli animale viuente*. Firenze 1684. in 4.

b) Vid. P. S. Pallantis *Diſſertat. de infeſtis viuentibus intra viuentia*. Lugd. Batav. 1760. in 4.



Neminem equidem puto, cui naturae historiae cordique est, fore, qui merita et tentamina van HELSVM, I. V. de CSER, Ioh. Georg. ROEDERERI, Frid. Guil. de GLEICHEN reliquorumque in hacce periodo non nouerit. Decennio vix praeterlapso a societate litterarum Hauniensi MDCCLXXX. quaeio ad disceptandum proposita, suppeditabat securae periodi originem. Cui societati, ni fallor, non clares solum et magnos progressus, hucusque in hac historiae naturalis parte factos, sed hoc etiam debemus, ut proprii vermes intestinales accuratius ab accessoriis distinguerentur, cum illa animalia innata esse, nec extrinsecus in corpus delabi ibique postea residere monstraretur. Diuisio vero haec intestinalium vermium vtvt erat vera et naturae consentanea, tamen quodammodo studio historiae vermium erat noxa. Etenim nunc fere omnes naturae scrutatores in eo tempus studiumque collocabant suum, prioris classis vermes curatius describerent, inque eorum naturam penetrarent, relicta et quasi neglecta quantulum altera est classe. Cum vero haec scribo, longe quidem absum, ut negem, ab illis, quos nominavi, viris, multas variasque res, quae ad hanc posteriolem pertinent classem detectas et accuratius, quam antea, descriptas esse, sed hoc tantum nego, quae de vermibus accessoriis relata sunt, ita extraneam dubitationis aleam posita esse, ut plane omnis disputationis vltiorisque disquisitionis materies quomodo sit abscissa et occupata. Nouimusne, ut

hoc utar, furiae illius infernalis naturam cuius nuper nouam fecit mentionem *Pallas* c)?

Ad hos igitur vermes accessorios iamdudum animum adieci meum, ut ad accuratiorem notitiam pro viribus meis quantulumcunque etiam sit, conferrem. Priscos inter Graecos et Romanos naturae studiosos nonnullos et inter recentiores multos, ut supra monui, qui ad hanc classem referri debent, vermes nouisse et cognominasse, concedo quidem, sed idem ego contendendo, naturam illorum illis non satis notam fuisse, neque varias illorum species systematico ordini subiectas. In quo quidem male fecerunt. Nam, ut equidem credo, haec classis est priori numerosior, si eam, ut fieri debet non ad homines solos, sed potius ad vniuersum animalium viuentium genus ablegaueris, cum non homo tantum, sed et reliqua animantia ab elephante usque ad insecta et pisces hanc classem fouent et alunt. Quantus igitur indagatori ad observationes rite instituendas patet campus! Horum huius classis vermium indicem delineare, ut ab aliis d) iam esse factum, noui, haud conor, quippe quod, ut ingenue fateor, ingenii vires exsuperat. Duas tantum ut, me ex parte promissis, olim factis, stare intelli-

c) Vid. eius *Neue Nordische Beiträge* 1 B. 1 St. p. 113. *Vergleichung einiger in Schweden, Rußland, Siberien etc. bemerkten tödlichen Krankheiten unter dem Namen der Brandbeulen.*

d) Vid. Carol. Frider. *Happii de vermium intestinalium historia* Dissert. Lipsiae MDCCLXXX.

alligant Lectores, commemorabo oestri species, insecti, quod quidem in omnibus, qui de naturae historia exponunt libris systematicis descriptum inuenitur, cuius vero natura describenda partiumque variarum delineatione, quibus aliorum animantium vitae aut salutati insidias struit, aut dissensus aut silentium obseruatur tantum, ut non possim non mirari, qui factum est, ut hoc genus non iamdudum ulteriori attentione dignum sit iudicatum. Longe tamen absum ab ea persequutione, ut putem, me ea peregrisse, quae ab aliis tractata esse cupiebam. Etenim pauca tantum huc pertinentia, tentaminis potius, quam eruditos docendi causa, cum Lectoribus communicare, animus mihi est, quae ut humane excipiantur enixissime rogo. Fortassis fieri poterit, ut si vires valeant, et quae nunc profero eruditorum plausum ferant, totum oestrorum genus breui temporis interuallo, ut nunc has species tractare possim.

## DE OESTRIS IN VNIVERSVM.

*Syst. Nat. Linn. Class. VI. Diptera. Alae duae, halteres clauati, solitarii pone singulam alam sub squamula propria.*

### Genus.

*Os nullum punctis tribus absque proboscide aut rostro exserto.*

Sub nomine *Oestri* Graeci muscarum genus describant, quod Romani *Asilum*, Angli *Wham* vel *Gad-*

*flies*, Galli *l' Oestrel*, Bataui *Horsel*, Sueci *Styng*, Dani *Stingflue*, Germani *Bremfen*, *Brämsen*, *Brömsen*, *Biffelsiegen*, *Biffelmücken*, *Dasse* appellant \*).

Cuius generis in priscis scriptoribus aliquoties quidem mentio fit, ita tamen, ut magis functiones quaedam earum leues et in oculos quasi incurrentes commemorentur, quam accurata characterum, quibus a se inuicem distingui possint, descriptio exhibeatur, multo minus omnes eius species penitus perspectae ipsis fuerunt.

Vt vero longo annorum interuallo multarumque gentium industria historiae naturalis fines amplificabantur etiam haec familia numerosior euasit ita, ut  
multas

- e) In nostra lingua plura nomina occurrunt e. g. *Bremex*, *Brämen*, *Viehbrehmen* etc. sed haec, ut ex accuratioribus scriptoribus apparet, non ad hoc, sed ad aliud genus, quod sub nomine *Myops*, lat. *Tabanus*, gall. *Le Taon*, angl. *Burrefly*, *Stowt*, *Breeb*, germ. *Breme*, *Pferdemücke* etc. notum est, referri debet. Quae quidem nominis mutatio apud latinos aliosque scriptores non inuenitur. Fortasse similitudo, quae inter verbum *Bremse* et *Breme* intercedit, occasionem huic confusione dedit. Miror igitur, etiam *Kruckenitzium* (vid. eius *Oekonomische Encyklopädie* etc. *Theil 6. Bremse.*) non latinas solum, sed et teutonicas cognominationes inuicem male miscuisse, et descriptionem nobis de hoc muscarum genere dedisse omni ex parte mancam atque confusam, ita, ut tractatio haec partim oestri, partim tabani sit historia. Cauendum igitur est, ut ne duo laetee inter se diuersa genera confundantur.



multas species iam nunc describere queamus, quae quoad formam et colorem et, ut larvae, quoad domicilium et figuram a se inuicem distinguuntur.

Apud *Linnaeum* \*) species quaedam sub oestri pastris nomine occurrit, quae vero ipso monente non id hoc sed ad aliud muscarum genus referri debet f). Porro *Houttuyn*, qui *Linnaei* naturae systema in bellicam transtulit linguam duas versicolores muscas ex America oriundas, adfert ad priorem *Linnaei* locum a me excitatum, ita vero, ut rem non ulterius perfequatur. Praeter has oestri species D. I. Sam. *Schröter* \*\*) etiam oestrum cum quatuor oculis instructum, qui ob hanc rem singularis esset, describit, sed *Schröterum*, ut facile fieri poterat, utrasque antennis cum oculis confudisse, de *Geer* \*\*\*) ostendit. Denique *Schregeri* \*\*\*\*) oestrum *Halensem* nullam singularem speciem,

A 5

sed

\*) Vid. eius Faun. Suec. p. 307.

f) In oestrorum historia, ut ex variis systemat. naturae editionibus apparet, non raro errauit et sibi met ipse contradixit *Linnaeus*. Quos vero errores maxima ex parte animaduertit et in ultima systematis naturalis editione paene omnes emendauit.

\*\*) Vid. eius *Abhandl. über versch. Gegenstände der Naturgeschichte*, I. p. 316,

\*\*\*) Vid. eius *Abhandl. zur Geschichte der Insecten*, B. 6. p. 117.

\*\*\*\*) Vid. eius nou. spec. Insect. p. 15.

sed ovis oestrum esse, notum est et nuper iterum comprobavit *Medeer* \*).

Inter oestrum et muscam maiorem quod ad externam formam attinet, quaedam intercedit similitudo, quod vero ad internam varia ratione a se inuicem differunt. Neque cibo neque potu egere oestri dicuntur, partim quod iis necessaria deessent instrumenta, partim quod corpore integro atque perfecto instructi, ob breue vitae spatium, iis haud egere viderentur <sup>g</sup>). Functiones eorum potissimum ad sobolem procreandam tendere videntur. Ad instinctum hunc explendum a media aestate ad autumnum varia animalia infestant. Quidam, uti a natura feruntur, tantum equis, asinis, mulis, alii camelis, bobus, vaccis, cervis, capreis, ouibus, alii rangiferis et feris et mansuetis, alii denique hominibus barbaris insidiantur.

\*) Vid. *Uebersetzte Abhandl. der Königl. Schwed. Akad. der Wissensch.* 1786. B. 7. p. 137.

g) Oestrus habet *Linnaeo* teste l. c. duas alas, sub quibus duo halteres, antennas globosas vel lentiformes infestatas, in sedam exeuntes, os nullum, loco eius tria puncta, rimam absque dentibus et proboscide, corpus villosum, in fine pedis duo hamulos, alarum conditio horizontalis est ita, ut margines earum interiores se inuicem tegunt.

Verum enim vero *Reaumur*, *Fabricius* et *de Geer* l. c. ex inferiori trium illorum punctorum, si muscae caput comprimitur, corpusculum tenue et oblongum prodire viderunt, quod linguam esse suspicati sunt.



ir. Quidam in naribus horum animalium, in sinu  
 ssis frontis inque faucibus suum occupant locum, alii  
 cute oua reponunt sua, alii in intestinum rectum  
 referuntur ibique ouula ab interitu defendunt. Quam-  
 uam omnes, vt fama est, oestrorum species illa ani-  
 malia neque pungunt, neque mordent, tamen ab iis,  
 quibus sese volatu susurrante produnt, reformidantur.  
 Quo igitur propius iis accedunt, eo magis perturban-  
 tur, grauiter spirare incipiunt, caput hinc illinc iacti-  
 unt, et, si his remediis hanc muscam abigere non  
 possunt, ferocitate abripiuntur ita, vt prae timore  
 sese in fugam coniiciunt, pedibusque sese de-  
 ant, id, quod imprimis ab animalibus iugalibus  
 eri solet. Neque tamen oestrus abstinet priusquam  
 consilio suo potitus oua sua in loca modo a me indi-  
 cata deposuerit, vbi naturali horum animalium calore  
 excluduntur et peracto hoc vermis exit, qui quotidie  
 crescit. Et ob hos vermes, qui laruae dicuntur,  
 et locum, cui illi insident, hoc muscarum genus no-  
 tu dignum est et in numero praesertim vero laruae  
 erminium intestinalium accessoriorum haberi meretur.  
 Magna de loco, quem singulae horum oestrorum  
 aruarum species tenent, est inter auctores discre-  
 pantia, de qua paulo infra plura dicendi occa-  
 sio erit.

Iam laruae hae in tenerrima aetate laruis musca-  
 rum, quae carnem petunt admodum sunt similes, eo  
 vero potissimum ab iis discrepant, vt adultiori aetate  
 illas magnitudine excedant et diuerso etiam nutrantur  
 ali-

alimento, quippe quod hae usque ad metamorphoseos spatium viuentia animantium corpora inhabitantes variis horum aluntur fluidis. Praeclare cum hisce afflictis animalibus agitur, quod multae harum prima iuventute pereunt, eae vero, quae incolumes seruantur per hyemem et ver iis in locis, in quibus exclusae sunt, remanent, usque dum adultiores factae sub aestatis initium per nares, aut cutem, aut intestinum rectum eiectae, in terra, aut sub lapidibus, aut in equino stercore absconditae in ouales duras et nigricantes imagines mutantur. Quo in statu per tres, quatuor, vel quinque permanent hebdomades, quibus praeterlapsis oestrus prodit, prioribus quoque naturam similis. Haec pauca sufficiant de vniuerso oestri genere. Caeterum adhuc moneo, opinionem meam<sup>h)</sup>, larvas in ventriculo equino non oestri haemorrhoidalis, sed nasalis esse, pluribus conatibus et experimentis esse confirmatam. Hinc patet, has larvas ex narium cavitae equorum, asinorum et mulorum vtriusque sexus faucibus, haud vero, ut nonnulli, quid? quod plurimi naturae indagatores statuunt, per intestinum rectum et totum intestinale canalem in ventriculum horum animalium deferri. Quod si mihi contigerit, esse tam felici, ut huius muscae, cuius obtinendae saepissime periculum fecerim, compos factus fuisset, plura hic additurus eram: nunc vero alii tempori haec referenda erunt.

DE

<sup>h)</sup> Vid. *Werneri* breu. expos. verm. intestin. Contin. secund. p. 83.

## DE OVIS OESTRO IN SPECIE.

*Oestrus ouis*, siue *Halenfis* SCHREBERI, Gall.  
*L'Oestre des moutons*, vel *la muche du vcr du nez*  
*des moutons*, German. *Stirngrübler* vel *Schaaf-*  
*bremse* vel *Nasenbremse der Schaaf* vocatur.

*Charact. Specif. a LINNAEO allatus.*

Alis subpunctatis, abdomine albo nigroque versicolore, corpus reliquis minus tomentosum nec villosum, oculi ferruginei, alae venosae versus basin punctatae, abdomen ovatum albido cinereum colore nigro maculatum, vertex capitis punctis numerosis excavatis, id, eius Faun. S. l. c.

*Charact. Specif. a MODERO definitus.*

Alis hyalinis rugosis abdomine niueo sericeo nigroque versicolore.

*Durchsichtige Flügel wie Glas, runzlicht oder gestreift, der Hinterleib hat eine Farbe aus silberweis und schwarz gemengt. Vid. Königl. schwed. Abhandl. and 7. pag. 137.*

Femina huius muscae, quae in oestrorum numero minima et ob pauidam ipsius naturam fugacissima habetur, ab initio mensis Augusti vsque ad Septembrem varias quaturopedes bestias, pro instinctu ipsi inuito, insectatur, ut ouis in cavitare narium et faucibus depositis hac ratione posteritati consulat. Notatum est, ut seniles et maceras acque, ac aegrotas sugiat bestias, contra sanas, iuvenes et bene nutritas sibi

sibi eligat. Haec musca uti ex experimentis rite institutis, ceruos, capreas, et oues urget, ita etiam rupi capris insidiatur: etenim haud raro eius laruas apud istas inueniri ex ore peregrinantis cuiusdam percepi. Alia vero animalia, quantum ego quidem noui, non insectatur, nec in eorum corpora oua deponit sua. Ob fugacitatem ipsi insitam non tam in stabulis, sed potius sub dio in campis pratisue haec animalia praecipue fatigata et requiei somnoque dedita inuadit. Alias enim musca difficulter in narium cauitatem intrare posset, quippe quod haec animalia spirando, caput huc illuc iactitando, aut celeriter currendo hunc hostem ad aliquod certe tempus a se detinere, eiusque conatus impedire sciunt. Sub somno igitur ac requie in narium cauitatem et fauces ipsorum delapsa, loca ouis deponendis apta sibi elegit. Profundiora scilicet et aspera petit loca, ut ne respiratione et mucro copiosius e naribus profluente maxima eorum pars, cum parum his locis adhaereant, e sedibus dimoueatursuis et pereat, quod eo facilius fieri posset, si incaute et negligenter in qualemcunque locum musca deponeret oua. Ouis igitur triginta et quadraginta depositis, oestrus animal, sine ullo alio huic illato detrimento relinquit et perit. Alii tamen aliam de hisce ouis in corpus horum animalium inferendis fouent opinionem. Putant enim oestrum sua oua alimentis animalium, quae hac via in corpora ipsorum delabantur immiscere. Ab omni autem veri specie haec sententia abhorret, eamque ouorum oestri in herbas, qui-



quibus illa animalia vescantur, depositionem neque  
 in stabulis neque sub dio fieri posse omnino nego.  
 unde enim nouerit oestrus qua herba, quo folio nu-  
 tiantur animalia? stabula vero ob fugacitatem fere pro-  
 priis fugere supra iam monui. Adde, quod et haec  
 musca, ut omnes oestri, pro lege naturae sancta omni  
 studio et diligentia incolumitati posterorum consulat.  
 qua ex lege, cum viuidiori eodemque fortassis haud  
 uiuendo sensu coniuncta, non iis licet sobolem ne-  
 gligere tanta cum incuria. Praeterea hanc opinionem  
 non illis, qui eam fouent, experimento ullo extra  
 hinc dubium posito, suffulciri, haud memini. Sed  
 haec haec haec. In illo statu oua non diu permanent,  
 sed animali calore excluduntur. Interea haud raro  
 fit, ut his ouis exclusis alia deponantur. Etenim plu-  
 res muscae iisdem et etiam variis temporibus, haec  
 animalia inuadunt, ut ex laruis diuersae magnitudinis  
 aetatis, facile est intellectu. Inde fit, ut cavitates  
 ariarum et fauces tanto ouorum et laruarum numero  
 interdum repletae, ut iis quotidie accrescentibus  
 animalia certo perirent, aut vita acerbissima crucia-  
 rentur, nisi natura alia ratione iis consulerit, et pro-  
 pagationi huius oestri accrescenti finis poneret. Lar-  
 uae enim ex ouis exclusae ut alimenta acquirant,  
 capita sua in interiores, quibus adhaerent, inge-  
 runt partes. Inde hoc stimulo, ex omni parte  
 priori facto, maior humorum ex naribus et faucibus  
 confluentium, fit secretio et muci copiosa excretio.  
 quo fit, ut oua nondum exclusa, et laruae his parti-  
 bus

bus nondum fatis firme affixae e corpore animali hac copiosiori profluuie eiiciantur et pereant. Sic oua, quae, vt supra dixi, parum adhaerent his partibus, et iuniores tenerrimique vermes, membris in hac aetate vti ignorantes, necantur. Porro non raro sterutare coacta altius fortiusque in et exspirant haec animalia et sic quoque aliqua ouorum et vermium pars e corpore eiicitur. Interea tamen vsque ad octoginta vel centum et plures laruae vita potiuntur, licet etiam concedam, in ceruis non nunquam tantum decem vel duodecim earum inuenisse.

Cuius quidem oestri mas, qui feminam in omnibus partibus quoad formam et colorem, aut fere plane quoad magnitudinem aequat his supra dictis animalibus non tantum infert incommodum. Etenim propagatione facta, perit. Forſan Lectores ſperabunt, vt hoc loco eius accuratiorem descriptionem atque imaginem oculis ipſorum ſubiiciam, ſed quamuis ſaepe hic oestrus, in ſyluis a me captus fuerit, tamen mihi nunquam contigit, eſſe tam felici, vt, quid quid conabar, ipſum e laruis et imaginibus progredientem viderem. Qua de cauſa potius ad *Reaumurium* i) Lectores ablegauerim, apud quem muſcam hanc deſcriptam et depictam inuenient, quam vt, ſine meis, iisque nouis experientis opiniones et aliorum delineationes denuo deſcribam atque depingam. Quodſi

i) Vid. Eius Memoires pour ſeruir à l'hiſtoire des Inſectes Tom. IV. Mem. XII. Tab. 36. p. 497.



quodsi mihi in posterum contigerit, nec illud plane spero, ut, experimentis factis illius auctoris celeberrimi descriptiones et imagines adhuc perfectiores addere possim, alia occasione haecce cum Lectoribus communicabo meis. Iam accuratiorem vermium siue muscae laruarum descriptionem proferam.

Intra aliquot dierum spatium, ut ante docui, muscae ova in corporibus deposita calore animali excluduntur. Quo facto ex ovīs exeunt vermes tues gracilesque, qui sub nomine laruarum veniunt. Muscae larvae a fine Septembris increscunt usque ad finem Maii sequentis anni, et ita quidem, ut eorum corpus in adultiori aetate intra triginta circiter dies maius, quam in iuniori per aliquot menses accipiat incrementum. Quarum magnitudo pro diuersis periodis est diversa. In prima enim aetate per integrum mensem nondimidiam lineae partem superant. Iisdemque instructae instrumentis et partibus, quibus adultae gaudent, sed, ut in aprico est, magnitudine et vi diuersis. Larva adulta, cum quieto statu renouet, duodecim lineas aequat, quodsi vero sese extendit, ut rependo fit quatuordecim excedit lineas. Larvae, *Tab. I. et depictae*, quarum una *Fig. 1.* versus tergum, et altera *Fig. 2.* abdomen versus spectat, nondum perfectam corporis magnitudinem assecutae sunt nec incrementum absoluerunt. Ex ceruo enim sub initio mihi accepi, inde suspicari licet, eas sub fine huius mensis maximam integritatem peruenire. Attamen et

in his animaduertimus, eas, modum descriptum acquisuisse, inde patet ultimam periodum potius ad perficiendas partes interiores, quam ad magnitudinem externam ulterius augendam consumi. Adulta larua corpore in medio diametrum exhibet tertiam pollicis partem aequantem in anteriori et posteriori parte contra eo magis coarctatur, ita, ut non abhorreat a duorum obtusorum conorum similitudine, basibus sibi met ipsis oppositorum. Quae forma praecipue tunc, cum repunt, obseruatur. Quodsi vero quiescit larua, praecipue anteriori et posteriori corporis parte magis retracta, cylindro fit similis. Inde mox conica, mox cylindracea inuenitur. Color sordide albidus flauus et rubicundus est. Tergum conuexum *Tab. I. et II. Fig. 1.* Abdomen magis planum, quam conuexum animaduertitur. *Tab. I. et II. Fig. 2.* Sed et harum corporis partium diuersa, diuersis rebus, ratio est, hanc vero laruam prae reliquis magis plano, quam conuexo abdomine gaudere, certissimum est. Numerantur incisurae corporis semper decem eaeque inaequales, quibus corpus in totidem inaequales diuiditur partes. *Tab. I. et II. Fig. 1. ee. ee. et Fig. 2. cc. cc.* In tergo semicirculares in abdomine vero planiores in omnibus laruis, quas obseruaui, fuerunt. In vicinitate harum incisurarum et praesertim in nouem anterioribus multae breues et corneae spinae, quarum in reliquis corporis partibus mira est raritas. positae sunt sic, ut nullum quidem ordinem, aequali

m vero obseruent altitudinem. In tergo rariores subtiliores, quam in abdomine inueniuntur *Tab. I. II. Fig. 1. 2. Tab. III. Fig. 2.* talem incisuram cum inis his optica lente auctam depictamque inuenient lectores, vbi spinas has perpendiculariter et dense iuxta se inuicem positas esse, perspicient. Caeterum harum densitas et copia his locis corpus fusco colore, non conspicuae sunt, induit et corporis motui haud parum inferuit. Iam larua nostra pedibus plane destituta est, quorum loco in marginibus abdominis lateribus, dextro scilicet et sinistro, varia tubercula, spinis posita, possidet. *Tab. I. et II. Fig. 2. ee. ee.* Desinant in tergo haec tubercula et plerumque tot numerantur, quot sunt incisurae, attamen memini, me aliquando, idque semel plura tubercula inuenire, quam incisurae aderant. Caput in quo variae distinguuntur inermibus oculis partes, si cum reliqua corporis magnitudine confertur, paruum est. *Tab. I. et II. Fig. 1. et 2. aa.* Praecipue in oculos incurrunt duo mobiles, parui, incuruati, cornei, fusco nigricantes iuxta se inuicem positi hamuli, qui vnci speciem praese ferunt. *Tab. I. et II. Fig. 3. dd.* caput et hamulos microscopio auctos, sicuti hos *Tab. III. Fig. 1.* inuenies. Duritiem corneam habent, nitent et abdomen versus incuruati sunt. Vnus quisque eorum ab initio duo processus, in anteriorem scilicet et posteriorem *Tab. III. Fig. 1. cc.* Iam processus terminantur quatuor radicibus albidis cartilagineis *Tab. III. Fig. 1. bb.* anterioribus et posterioribus. Quae radices cum vs-

que secundam incisuram in corpus penetrent omnem istorum hamulorum vim atque firmitatem ab illis esse deriuandum, vnicuique facile erit intellectu. Praeterea mirifice et firmè cum interioribus partibus praefertim cum cute cohaerent radices, larua igitur, hoc instrumento praedita, mira peragere potest. Huius enim artificio, vt infra docebo, celeriter corpus commouet suum, et alimenta sibi parat commodissime. His quoque hamulis larua, ventriculum equi inhabitans, gaudet et vt, alibi <sup>k)</sup> demonstraui, eodem feliciore cum succèssu vtitur. Vtrique anteriores processus excauati sunt et duos recipiunt oesophagos \*), qui statim sub acuto angulo vniuntur, in corporis vero profundiore loco iterum secedunt, et bifidum formant ventriculum. Porro in media capitis parte intra hos hamulos aliud et minus inuenies orificium *Tab. I. et II. Fig. 3. a.* quod organon laruae expirationis esse, suspicor. Equidem quamquam omnem indagandi naturam huius expirationis organi operam dedi, tamen nihil, nisi breuem anastomofin cum ramis vasorum aëreorum organi inspirationis, in posteriore corporis parte positi, detegere me potuisse, ingenue fateor. In suprema capitis parte et quidem in eius margine superiore *Tab. I. et II. Fig. 3. ee.* duo cernuntur parua, rotunda, sibi e contrario opposita et aequalia

cor-

k) Contin. secund. Tab. IV. Fig. 1. bb. p. 89.

\*) Eorum orificia deprehendes Tab. I. et II. Fig.



corpuscula, quorum auxilio larua sentit. Qui acini sensorii, liceat enim mihi hac uti denominatione, hisce laruis cum iis, qui ventriculum equinum inhabitant <sup>1)</sup> communes sunt. Eo loco, quo de structura horum cinorum sermo fuit, sententiam meam argumentis stabilire annisus sum, quae, ut hic repetantur, haud superfluum esse, duco. Exeunt ex his acinibus plures striae, quas nervosas esse paulo timidior olim conieci. Nunc vero, cum multa et varia rite instituerim experimenta, eas strias nervos esse certissime scio. De quibus paulo infra, cum interiores huius laruae partes cum Lectibus meis communicauero, ulterius faciam sermonem. Caeterum hi acini sensorii non tali quidem audent basi cornea, qualem apud illas, quae ventriculum equi inhabitant laruas,prehendimus, extrisq; tamen nervi, per totum corpus migrantes originem trahunt suam. Quid? quod in his contentum esse cerebrum, venia sit verbo, quis est, qui neget? His enarratis partibus exornatum est caput. Praeterea in basi eius multae sunt et sine ordine iuxta se inuicem positae, spinae. Quod reliquum est, caput omnesque in eo contentas partes larua ex arbitrio surrigere et imminenti periculo subtrahere potest.

Posterior corporis pars propter singularem eminentiam anteriori est crassior et magis obtusa. Quae eadem eminentia siue margo sublimis valuulae femi-

B 3

cir-

1) Cont. Secund. Tab. IV. Fig. 1. cc. p. 89.

circularis speciem prae se fert, et ab vno corporis latere super tergum ad alterum tendit. Superficies eius superior conuexa, inferior concaua est. Hanc partem, vt sub respiratione fit, et eleuare et constringere potest larua: eamque optica lente admodum auctam eiusque in primis superficiem concauam *Tab. I. et II. Fig. 4.* depingere studui. Cum vero eius adspectum pictura ad naturam exprimere difficile sit, laruae aspectum, optimam imaginem esse libens lubensque concedo. In hac superficie concaua duo numerantur corpora, semilunaria, cornea, fusca, e regione sibi opposita. Recipiunt illa duo organi inspirationis orificia *Tab. I. et II. Fig. 4. bb. cc.* Celeberr. REAUMVRIVS <sup>m)</sup>) corpora haec semilunaria depingi iussit rotunda et vno tantum orificio praedita. Quam diuersitatem nulla in earum laruarum, quas mihi contemplari licuit, obseruare potui, etsi omnem in experimentis rite instituendis adhibui operam. Forsan harum partium varietatem facilius ex artificis, quam REAUMVRII negligentia ortam esse, suspicari licet. Leues porro, ab isto auctore plane neglectas, in his corporibus animaduerti incisuras excauatas atque curvas, partem hanc egregie exornantes. Porro omis- sum censeo tertium quoddam sub antecedentibus collocatum foramen. Quod, vt duo illa paulo ante descripta foramina, quae a corporibus semilunaribus efficiuntur, constituit canalium siue vasorum aëreorum organi

m) Vid. REAUMVR. l. c. *Mem. 12 Tab. 35. Fig. 10.*



organi inspirationis principium. *Tab. I. et II. Fig. 4. cc.*  
*Tab. I. et II. Fig. 4. a.* Sub hoc foramine positum  
 est aliud, quod difficulter et non nisi tunc in conspe-  
 ctum venit, cum laruae ad manus sunt paulo viuidio-  
 res et inspirantes. In his enim mox diductum mox  
 contractum inuenies et laruam satis bene his respira-  
 tionem absolvere orificiis, intelliges. Tria haec ori-  
 ficia quae breuitatis causa *organon* voco *inspirationis*,  
 in duo, vt paulo infra monebo, canales aëreos, per  
 totum laruae corpus migrantes, abeunt. Praeter haec  
 aliam adhuc partem, fossam scilicet in postrema cor-  
 poris parte positam, anumque recipientem vides.  
*Tab. I. et II. Fig. 4. f.* Quae fossa, siue rima trans-  
 versalis, a quatuor in extrema corporis parte eminen-  
 tiis formatur. Eminentiam superiorem maximam et  
 satis longam, laterales vero paruas et rotundas et in-  
 feriores denique oualem et mediocri magnitudine  
 conspicuam deprehendes. Vid. *Tab. I. et II. Fig. 4.*  
*ee. gg.* Omnes quatuor inter se coniunctae eminen-  
 tiae aut diducere, vt in excretionem aluina fit, aut hac  
 excretionem peracta, contrahere potest larua. Qua  
 ratione fit, vt orificium ani in hac fossa abditum et  
 praecclusum semper inuenias.

Hae sunt partes in exteriori corporis parte aut  
 oculo inermi aut armato conspicuae. Antequam vero  
 ad internarum huius laruae partium descriptionem ac-  
 cedam, sordidam illam quidem cutem, satis tamēn  
 pellucidam esse, commoneo. Intestina igitur, praefer-  
 tim crassa, adfuso sanguine turgida indeque rube-

facta, per cutem conspiciere licet: id quod quoad abdomen *Tab. I. et II. Fig. 2.* et quoad tergum, *l. c. Fig. I.* icone expressum et confirmatum deprehendes. Porro cutis ita corpus cingere solet, ut humores eo contenti fontis instar salientis profiliant, si acu hanc aperueris. Inde patet, non cutem solum arcte vestire corpus, sed magna etiam elateris vi praeditam, eamque tantam esse, quantam in nulla alia corporis animalis parte observaui. Si enim instrumento leuiter tantum hanc incidi cutem, humores omnesque interiores partes non solum magna propellebantur vi, sed et cutis ipsa intra breue temporis spatium sic sese contrahebat, ut pristinam crassitiem et densitatem ter quaterque superaret. Quo facto, eam diducere, frustra conabar. Cum vero ab isto conatu non abstinirem, sed repetita vice et magna vi eam diducere anniterer, subito illam perire inueni vim elasticam, quod et accidebat cuti exsiccatae. Eandemque huius elasticitatis in larvis, spiritu vini fortiori submersis, observaui iacturam. Larvas denique, satis diu in hoc liquore adseruatas, colorem pallide flavescentem, in nigriorem et obscurum, quem et spiritus vini recipit, mutare, notatu dignum esse censeo.

Quodsi instrumenti ope aperitur larua eiusque tergum, ut ego feci, inciditur, *Tab. I. et II. Fig. 5.* canales arteriosi, siue aërei inter multa albida, numerosa et subtilissima filamenta, quorum originem equidem nondum detegere potui, prominent. Qui duo canales, vix sextam lineae partem excedentes albae sunt

nt et cartilagineae naturae, ideoque discissi non  
 ollabuntur, sed arteriarum animalium instar hiant.  
 ttamen eorum parietes subtiles sunt et admodum  
 ellucidi. Ex illis, quae supra descripsi, duobus  
 ificiis superioribus, organi inspirationis, in poste-  
 ore corporis parte positi, suam, dum antea breuem  
 nalein orificiū inferioris eiusdemque organi reci-  
 unt, originem trahunt. Iam ad mediam fere cor-  
 oris partem, vbi intestina crassa sunt, ductu tendunt  
 erpentino, quo loco se inuicem coniungere videntur.  
*Tab. I. et II. Fig. 5.* Discedunt vero statim a se inui-  
 em et sensim sensimque caput versus et ventriculum  
 a subtilissimos exeunt furculos. Quo in itinere non  
 olum, quoad diametrum, decrescunt, sed etiam nu-  
 merosos ramos spargunt. *Tab. I. et II. Fig. 5. gg.*  
 ramulos hos ex vno tantum latere vnus cuiusque  
 runci oriri, rem singularem esse duco. Horum enim  
 runcorum latera interna et sibi inuicem proxima ne-  
 nicum ad vicinas partes ramum mittunt. Vnus vero  
 quisque ramorum istorum diuiditur in duo ramulos,  
 ui iterum in minutissimos furculos abeunt et maxima  
 ex parte cutem petunt. Reliqua furculorum pars adit  
 massam albidam, pulmenti similem et aequaliter per  
 totum corpus dispersam. Variis, iisque insignibus vsus  
 um lentibus optcis, attamen in massa hac ne mini-  
 mum structurae organicae vestigium obseruare mihi  
 contigit. Sic quoque frustra furculorum, qui cutem  
 petunt, fines persequi conatus sum, id quod praecipue  
 molestum tuli, quum iam ante, vt in variis aliis inse-

Etis deprehendere licet, suspicatus sum, eos orificiis  
 patulis in externa cutis superficie et praeprimis intra  
 illa tubercula lateralia finiri. Vt igitur de hac opinione  
 certior fierem, duo istos canales aëreos, tubuli capil-  
 laris vitrei ope, quo ad iniectiones subtilissimas ana-  
 tomici vtuntur, mercurio repleui, spe fretus, fore,  
 vt mercurius per cutem transsudet. Quamquam autem  
 canales istos cum ramis, ramulis et furculis minutissi-  
 mis egregie repleui, quae vascula argentea oculis  
 suaue praebebant spectaculum, tamen ne vnicum mer-  
 curii globulum e cute progredientem vidi. Accura-  
 tiori examine instituto, mercurium quidem cutem  
 adiisse, in eius vero superficie interna haesisse con-  
 spexi. Igitur vtrum a natura nullius his furculis sit  
 per cutem transitus, an nimia cutis vis elastica eam  
 imperuiam fecerit, dubius ancepsque haereo. Sub  
 horum vasorum aëreorum truncis intestina in primis  
 crassa, tres diuersa diametro canales, quos depictos  
 habes *Tab. I. et II. Fig. 5. k.* tribus principiis sub capi-  
 tis regione a ventriculo bifido oriuntur et ad me-  
 diam vsque corporis partem tendunt, quo in itinere  
 et praecipue tunc, cum mediam corporis partem atti-  
 gerunt, numerosos canales laterales dispergunt, omnes  
 tandem, multis variisque flexionibus factis, in vnum  
 communem truncum, in anum scilicet sese terminan-  
 tem, colliguntur. *Tab. I. et II. Fig. 5. dd.* Quem  
 numerosum et conuolutum horum canalium progres-  
 sum, ne aliarum rerum delineandarum perspicuitati  
 nocerem, depingere, de industria neglexi. Ventri-  
 culus



lus *Tab. I. et II. Fig. 5. cc.* in vicinitate capitis,  
 ulo vero profundius quaerendus est. Bifidus est, et  
 duplici principio, seu oesophago, in processibus  
 is anterioribus concauis ortus, *Tab. I. et II. Fig. 3.*  
*. cc. et Tab. III. Fig. 1. cc.* in crassa iam descripta  
 testina exit. Praeter has inspirationi aequae, ac di-  
 ffectioni inferuientes partes, de quibus hucusque ser-  
 o fuit, adhuc aliae ad corpus mouendum commo-  
 ssimae notantur. In ventre scilicet et quidem in  
 superficie cutis interna varia fibrosa strata numerantur,  
 nae, si partes antea descriptas remoueris, facile in-  
 culos incurrunt, et omnia se inuicem decussant atque  
 e progrediuntur, vt breuiora sint, quae inferiori,  
 ngiora vero, quae superiori posita loco reperiantur.  
 b vno corporis latere longiora incipiunt et in altero  
 pposito terminantur. Gracilia sunt et cultro facillime  
 edunt. Quae *Tab. I. et II. Fig. 5. ee.* depicta inue-  
 nient Lectores, ea propter colorem satis rubrum  
 uerunt prae reliquis conspicua. Litteris *ff.* configura-  
 a, inferiora sunt et breuia ac in vnoquoque corporis  
 latere singularis eorum series deprehenditur. Ex  
 tuberculis lateralibus illis, *Tab. I. et II. Fig. 1. dd.*  
 riginem trahunt suam, et in medium ventrem inse-  
 untur. Idem ordo in altero opposito latere a natura  
 ormatus obseruatur. Horum igitur stratorum car-  
 osorum duplex ordo in media ventris parte confluit.  
 nde hoc in loco punctum iis esse fixum, vnusquis-  
 que facile intelliget. Super his alia strata, quorum  
 am mentio facta est, iacent. Ea antecedentibus lon-  
 giora

giora sunt (*Tab. I. et II. Fig. 5. ee.*) et a tuberculis lateris vnus ad tubercula alterius tendunt. Singularem gaudent muscolari vi: inde omnis laruae ad rependum robur.

Praeter haec dextrorsum atque sinistrorsum duae adhuc albidae striae, multos ramos dispergentes, conspiciuntur, quae e corpusculis illis rotundis, quae acinos sensorios cognominaui, *Tab. I. et II. Fig. 3. ee.* et omnes a capite vsque ad anum interiores partes per totam tractus longitudinem adeunt. Nervosae sunt et medullares; inde omnis ab iis dependet vis vitalis. Vnaquaeque stria varios dimittit ramulos. Exteriores satis longi sunt et copiosi, multosque furculos superficiei cutis internae largiuntur; interiores vero sunt breues et rari, nullosque praebent furculos, sed statim potius cum similibus furculis oppositae striae anastomosi in eunt *Tab. III. Fig. 4. cc.* Duae hae striae, siue corpora medullaria satis microscopio aucta et accurate depicta inuenient *Tab. III. Fig. 4.* Lectores. Singulas eum in finem delineare studui, vt eorum habitus atque natura unicuique ad intelligendum sit facilis.

Accedo nunc, descriptione externarum aequae internarum partium huius laruae absoluta, ad quasdam functiones in ipsa notandas. Cum, vt supra iam monui, larua pedibus sit destituta et tamen saepissime locum suum permutet, hac ratione hanc loci permutationem peragit: vtrosque hamulos incuruatos in capite tantum extendit, quantum vilo modo potest,  
eorum-



rumque ope sese alicubi infigere annititur: deinde incisuras corporis anteriora versus contrahit, quo facto prot partesque corporis anteriores contrahere valet. Simili modo serpit et progreditur larua cum in corpore animali, tum extra illud. Cum cutis sit pellucida, larvam prius, quam incisuras anteriora versus trahebat, anteriores partes contrahere obseruavi, ita, ut capiti propiores iaceant. Quamdiu igitur larua serpit, interiores quoque partes continuo mouentur. Ut contractae posteriores incisurae, cum caput et anterior corporis pars extendenda est, in hoc statu permaneant, tubercula lateralialia quibus innititur, donec functionem absoluit, efficiunt. Eadem ratione procedit, cum contractis partibus anterioribus, posteriorum corporis partem attrahere conatur. Haec tubercula lateralialia pro arbitrio attrahere et extendere potest. Quae corporis et tuberculorum virtus ipsi magnae est utilitatis, cum metamorphoseos tempore sese in terram abdit. Etenim quando anteriorem corporis partem extendere vult, tuberculorum usu posteriores incisuras in statu detinet naturali iisque sese affigit. In contrahendis vero incisuris posterioribus haec tubercula sibi impedimento forent, nisi ea in functione haec eragenda attrahi possent. Quo quidem facto superficies corporis externa laevis fit, ita, ut facillime in terram sese abscondere queat. His igitur instrumentis larua celerrime mouetur et insignes sui corporis vires transferit. Quodsi vero larua corpora animalia ad alimentum sibi comparandum perforare cupit, hac ratione

tione utitur. Capite suo longiori extenso cum utrisque hamulis incuruatis ita se iungit, ut posteriorem corporis partem per tubercula suffulcire queat, tunc hamulis illis utrisque sibi attractis, denuo infecat, quo facto rursus sese contrahit, hosque motus continuat usque dum ipsi, quod brevi tempore fit, his instrumentis acribus iisdemque lacerantibus vulnus efficere contigerit. In hoc vulnus capite penetrat sibi pro lubitu amplum parat locum. Quodsi caput satis profunde in vulnere hoc abscondidit, incuruatos hamulos longe lateque extendit ad situm hunc conservandum. Quo in statu permanet, sanguine et animalium sero vescens, quod ob hamulorum stimulantium usum magna semper copia ad vulneratum adfluit locum. Quam profunde larua penetrare, quam arctius adhaerere et quanto dolore animalia, quae incolit, affligere possit, vix credibile est. Ipse eiusmodi experimento, in me facto hoc compertum habeo. Quasdam larvas esurientes manibus meis imponebam, duas intra digitos, quas arctius ad se inuicem apprimebam, irripebant et statim cutem incidebant. Vix ac ne vix quidem dolorem acrem et vrentem sic mihi illatum perferre poteram. Intra quinque vel sex temporis momenta ita sanguine meo turgebant, ut rubram induerent formam atque colorem. Quas cum auellere tentarem, non nisi magno studio id et nouo cum dolore peragere poteram. Sex horis post hoc experimentum in vulneribus admodum exiguis, mihi factis, quorum margines inflammatae erant, do-

lorem

rem flagrantem percepi, dolori, quem vrticae exci-  
se solent, similem.

Laruae incremento suo absoluto per se animale  
corpus derelinquit et cum muco, ex naribus profluente,  
eunt. Tunc, si res ita fert, in terram abscondi-  
e per breue tempus in imagines mutantur. Earum  
tis rugescit et discedit, atque imago, fusco nigricante  
bro colore praedita, oualis, insecta, et nouem cir-  
ter lineas longa in prospectum venit. Inter quam  
reliquis oestrorum alius speciei imagines, quae in  
oc statu difficile a se inuicem dignosci possunt, magna  
tercedit similitudo. Quae imago a REAUMVRIO <sup>n)</sup>)  
Mincte et egregie descripta et depicta, vbi tactu sol-  
citatur, vitae indicia edit, pro rerum ratione per-  
ensem in terra permanet denique hiatu in ante-  
ori eius parte facto oestrum ouinum in lucem edit.

Quodsi has laruas cum illis, quae ventriculum  
qui inhabitant, comparamus, sic a se inuicem  
fferunt:

Larua nostra corpore non ex omni parte rotundo;  
la vero plane rotundo gaudet.

Nostrae corpus semper decem incisuris in decem  
niditur partes inaequales, illius vero nouem vel  
ndecim incisuris in totidem diuiditur partes.

Nostra multis et numerosis spiniis, quae omnes  
d perpendiculum corpori adhaerent; illa vero duplici  
antum spinarum, quae oblique positae sunt, ordine  
bsita est.

E 2

Nostra

n) Vid. REAUMVR l. c. *Mem.* 12 *Tab.* 35.

Nostra duplici ore, duobus capitis lateribus infito; illa simplici in media capitis parte posito, utitur

Nostra organo expirationis in anteriori corporis parte praedita est, quod in illa detegere frustra conatus sum.

Nostra in posteriori corporis parte valuula quaedam siue margine sublimiori, in quo organon inspirationis, e tribus orificiis constans, reperitur, exornata; illa his omnibus plane est destituta, et eius organi respirationis alia est ratio.

Nostrae orificium ani in infima corporis parte factum et ab organo inspirationis est remotum; illius vero intra illud organum observatur.

Sed haec pauca criteria, extrinsecus decerpta sufficiant ad larvam nostram ab illa distinguendam. Restant alia, quae ab interioribus desumi queant. Vnusquisque vero curiosus et diligens larvarum indagator haec, si lubeat, facile vel ex descriptione nostra vel ex re ipsa desumere ac supplere potest.

Cum vero larvae animalibus, in quibus exclusae sunt, praecipue si magna earum adest copia, admodum sint nociferae, quippe quibus inflammatione spasmi, gangraena et vel mors praematura conciliari potest, iam dudum meditatus sum, quibus remedia ex animali corpore amoveri possint, et cum praeter *Linnaei* sternutatoria nullum in promptu sit efficax medicamentum, eo studiosior his afflictis animalibus consulere incipiebam. Quam difficile vero sit, viver



animalia in aliis viuientibus sine detrimento horum  
ecare, vel is perspicere potest, qui a medicina alie-  
s est.

Ad illa vero remouenda non opus est semper  
tioribus et efficacioribus remediis et dosibus maio-  
us, sed aptis medicamentis, patientia, tempore  
rebus fauentibus. Quamobrem varia tentamina,  
n structuram et harum laruarum functiones peni-  
s cognossem, institui, et aut organa respirationis  
struxi, vt laruae suffocatione perirent, aut sic  
turbauit, vt sponte corpus derelinquerent ani-  
male.

Laruas spiritu frumenti vel saturata salis culinaris  
solutione tingebam; mirifice anxieque sese motita-  
lit, sed ne vlla periit.

Nonnullas spiritu vini rectificatissimo perfunde-  
m, quo facto mortis quidem speciem prae se fere-  
bat, sed omnes paulo post reuiuifcebant.

Aliquot per quindecim temporis momenta spi-  
ritu frumenti vel saturatae salis culinaris solutioni  
mittebam. Exanimes esse videbantur, sed mox  
conualefcebant.

Easdem per idem temporis interuallum in spi-  
ritu vini rectificatissimum iniectas omnes enecatas  
fuisse, obseruaui.

Cum oleo amygdalarum rancido nonnullarum  
respirationis organa obliuui, languescebant quidem,  
nulla periit.

Nonnullas eodemque oleo superfundebam, quindecim temporis minutis post, nullum quidem in iis corporis motum animaduerti, sed paulo post reuiuifcebant.

Aliquot in oleum terebinthinae iniecti, post quindecim circiter temporis momenta enecatas vidi.

Sulphuris incensi vaporibus omnes intra quinque temporis momenta suffocabantur.

Per sex, fere septem dies absque alimentis plures laruae vixerunt.

Quibus ex experimentis, ut mihi videtur, patet, has laruas dura et tenaci uti vita, nec ullam reliquarum Oestri laruarum praeter hanc, tantum incommodi perferre posse. Caeterum cum arctius cum animalibus, quae ipsas excludere, exclusasque alunt, cohaereant, sequitur, difficile ex animalibus eiici posse, nec sternutatoria ad id perficiendum, uti *Linnaeus* promiserat, sufficere. Coniuncta vero cum aliis medicamentis, quae eas perturbant, defatigantque aut ex locis suis mouent, saluberrimos proferre possunt effectus. Equidem putò, felici cum successu sulphuris accensi vapores in animalium nares immitti, aut spiritum frumenti aut oleum rancidum ingeri, et si his ad sternuendum nondum coacta fuerint animalia; uonos stimulos iniici posse, ut laruae perturbatae uelimentiori sternutatione e corpore depellantur. Hac ratione spero, fore, ut, nisi omnia animalia, nonnulla tamen ab his laruis liberentur.

Praeterea et hoc moneo, quod monitum ad omnia helmintica pertinet, vsum horum medicamento-  
rum cautiorem esse adhibendum, nec statim desperari  
coere, nisi statim diebus primis exoptata sese exse-  
re sanatio.

Magnis dosibus medicus incautus aequè animalia  
vermes enecare potest.

## DE BOVIS OESTRO IN SPECIE.

*Destrus bouis*, Gall. *l'Oestre des Boeufs*, Germ.  
*Viehbremse*, *Ochsenbremse*, *Kuhbremse*, *Bissel-  
mücke*, *Dasse* appellatur.

*Charact. Specif.* a LINNAEO definitus.

Alis maculatis, thorace flauo, fascia fusca, ab-  
domine flauo apice nigro. Vid. eius *Faun. Suec.* l. c.

*Charact. Specif.* a REAUMVRIO allatus.

Alis immaculatis, thorace antice posticeque pilis  
seis apiceque flauo fuluis. Vid. eius *Histoire des Inf.*  
*Tom. IV. Mem. 12.*

*Charact. Specif.* a MODEERO constitutus.

Alis sordide albidis margine exteriori subfuligi-  
no, thorace longitudinaliter sulcato, atro, pilis  
praesertim basi fuluescentibus adperso, collari scutel-  
læ piloso albedo, abdomine tomentoso nigro basi  
apiceque fuluo.

*Schmutzig weislichte Flügel am äussern Rande  
mit rusfarben. Das Bruststück längsthin schwarz ge-  
furcht,*

furcht, besonders der vordere Theil mit feuergelblichten zerstreuten Haaren, Halskragen und Brustschild mit weißlichten Haaren, der Hinterleib dickhäutig, schwarz vorwärts weis, am Ende feuergelb. Vid. Königl. Schwed. Abhandl. Band 7. p. 131.

Charact. Specif. a DE GEER.

Die schwarze Viehbremse mit ungeflechten Flügeln vorn und hinten grau behaarten Brustschilde, mit vornen grau und hinten braun gelb behaarten Hinterleibe. Vid. eius Geschichte der Insekten, Theil 6. l. c.

Charact. Specif. a LĒSKIO.

Das Brustschild ist mit gelben Haaren besetzt quer über braun bandirt, der Hinterleib gelblicht braun der Schwanz schwarz, die Flügel braun bandirt. Vid. eius Anfangsgr. der Naturg. Band. 1. l. c.

Haec Oestrorum species quoad colorem et pilos apibus flavis et quoad corporis magnitudinem violaceis muscis, quae animalium carnes inuadunt similis est.

Haud semper uno eodemque colore in variis muscis tincti sunt pili, sed mox oestri bouini deprehenduntur flavis, mox griseis pilis exornati. Plures vero flavis gaudent. Inde, si solummodo ad pilos respicis, bouis difficiles sunt ad distinguendum oestri. Huius muscae caput prae reliquis corporis partibus satis magnum est, et magis latum, quam crassum. Eminent inferiora versus et prae se fert piri speciem.

Pars



rs eius superior admodum pilosa est. In orbitis  
 asi latent antennae. *Tab. III. Fig. 7. b. et Fig. 8. a.*  
 piti noctuae igitur simile est. Vtrisque antennis e  
 gro fuscus color et singularis est structura. Ouales  
 et in tria membra siue articulos diuisae. *Tab. III.*  
*Fig. 7. b.* Exit vna quaeque in setam, vel in pilum  
 eriora versus acutum et rigidum, qui magis in la-  
 e, quam in media antennae parte positus depre-  
 nditur et loco, quo inseritur, articulo gaudet.  
*b. III. Fig. 7. et Fig. 8.* In vicinitate earum iam  
 o oculi maiores ferruginei, siue fusco nigricantes,  
 ales et retiformes in duobus capitis lateribus con-  
 ciuntur *Tab. III. Fig. 6. et 7. aa.* Haud procul  
 his remota sunt tria alia corpuscula a *Reaumurio* et  
*skio* \*) ocellorum nomine insignita. *Tab. III. Fig. 6.*  
 orum trium corpusculorum inferius excavatum esse  
 aliud corpusculum tenue oblongum amplecti, iam  
 m suspicatus est *de Geer* \*\*). Porro nuper nos, ex  
 c, si caput comprimitur, idem prodire corpuscu-  
 m, linguae-simile, *Cel. Modser* edocuit \*\*\*). Du-  
 is ego ancepsque haereo, an horum celeberrimo-  
 rum virorum sententiae accedam. Ingenue enim fa-  
 or, me credere, fere omnes partes, pressione et  
 quadam ex tenebris in lucem protrusas, in dubium  
 e vocandas. Interea sit, cum praesertim observa-  
 tionibus his non extra omnem dubium positum sit, vtrum  
 mentis vtatur oestrus, an non. Certe, ex mea  
 C 3 qui-

\*) l. c.

\*\*) l. c.

\*\*\*) l. c.

quidem sententia, a naturae legibus non abhorre-  
videtur, contendere; oestrum propter vitae breuita-  
tem et perfectam corporis sui conditionem ab alimen-  
tis omnibus abstinere. Interea *Reaumurius* quoque  
sub antennis fossam esse, mira pilorum copia obsitam  
inde aspectu difficilem, os vero constituentem, con-  
cedit. Quis autem vnquam vidit, quod certissime  
non raro fieret, si contraria sententia veritati respon-  
deret, oestrum, alimentis vtentem? Sed reuertor  
vnde digressus sum. Thorax tribus rimis secundum  
longitudinem est sulcatus, quae nigriori colore tinctae  
tunc demum satis conspiciuntur, cum pili, quibus  
obsitae sunt, remouentur *Tab. III. Fig. 6. bb.* Aliae  
muscae tres habent similes secundum longitudinem  
excauatas rimas, quae ab alia transuersa decussantur.  
Aliae duabus modo breuibus, leuiter tantum excava-  
tis et vix ac ne vix quidem transuersam rimam attin-  
gentibus, rimis gaudent. In prioribus muscis totus  
thorax, in posterioribus eius modo latera pilis griseis  
obsita sunt. Rimae illae siue tres, siue duae tantum  
multum conferunt ad oestrum hunc ab aliis, alius spe-  
ciei, distinguendum. Praeterea duas hic oestrus ha-  
bet sordide albidas alas exteriora versus pellucidas.  
*Tab. III. Fig. 5. ee.* versus interiora vero opacas.  
*Tab. III. Fig. 5. ff.* quas sic dirigit, vt margines ea-  
rum interiores sese inuicem tegant.

Sub his et praeprimis sub insertionis earum loco  
duae rugosae squamae sunt conspicuae sub quibus aliae  
maiores, laeues, versus superiora striatae, inferiora

fus excavatae sunt, quae halteres subter iacentes,  
 unt. *Tab. III. Fig. 5. d. et Fig. 6.* Inferior ab-  
 minis pars pilis tecta est fulvis et in fine eius oestro  
 ri duo sunt vnci, e regione sibi oppositi et interiora  
 fus collocati, quibus erectis in coitu amplectitur  
 minam. Feminae contra in hoc loco organon est,  
 o oua deponit (*der Legekanal, Legeflachel*) *Tab. III.*  
*Fig. 5. c.* et quod secundum longitudinem ex quatuor  
 tibus constat, quae eum in finem, uti inuolucra  
 i optici, in se inuicem immitti possunt, ut eo com-  
 odius totum organon in corpus retrahere et pro lu-  
 di protrudere possit oestrus. *Tab. III. Fig. 9.*  
*bbbb. ee.* Hae descriptae partes quatuor inuolucro  
 neo, satis firmo extrinsecus cinguntur, ne vllum  
 imminenti periculo capiant detrimentum. Supe-  
 ra versus organon, quo oua deponuntur, termi-  
 tur duobus foliis sic, ut iterum his foliis versus la-  
 ra adhaereant tria alia folia. *Tab. III. Fig. 9. ee.*  
 ae superior organi pars a specie lilii florentis  
 n prorsus abhorret. Porro tria illa folia lateralia in-  
 cos, paruos interiora versus incuruatos, abeunt,  
 o sit, ut oestrus hac exornatus parte ouis depo-  
 ndis perspicere possit facillime. *Tab. III. Fig. 9.*  
*c. a. et Fig. 10. a. c. a.* Denique muscae huius  
 ura et femora nigra et inferiora versus pilis flavis  
 osita sunt. Pedes pallide flavi, duabus albidis un-  
 gulis et squama, instar plantae pedis, sunt exstructi.  
 tra quamlibet ungulam vnum, plures vero pilos in  
 liquis femoris et pedum locis inuenies.

Huius muscae mas, quem alibi <sup>o)</sup> depictum dedi-  
 aliis animalibus non admodum est molestus. Femina  
 contra, quam microscopio auctam *Tab. III. Fig. 5*  
 Lectorum oculis subieci a media aestate vsque ad  
 autumnum, boues, vaccas, ceruos, capreas et, ex  
*Mulleri* <sup>p)</sup> opinione, camelos, vt eorum cuti oua im-  
 ponat sua, infestat. Id quod non raro tanto peragi  
 studio atque diligentia, vt per plures dies animalia  
 illa persequatur, si impedimenta ipsi obiciantur. In  
 nares equorum irrepere ibique posteritatem curare  
*Leskius* <sup>q)</sup> quidem affirmat, sed, vt alibi docui <sup>r)</sup>, id  
 non ab hac, sed ab alia peragitur musca. Memini  
 quoque me legere loco, nescio quo, sub cute canis  
 domestici, pilis crispis praediti, laruas huius oestri  
 non nullas inuentas esse. Quodsi vere accidit vn-  
 quam, muscam necessitate coactam et commodiori  
 loco destitutam oua illic reposuisse, clarum esse,  
 duco. Nam, vt certe nouimus, nulla, nisi supra  
 nominata animalia, sibi ad oua ibi reponenda eligit.  
 Adde, quod tantum iuuenes, saluas et incolumes et  
 bene nutritas, tres, quatuor, et quinque annos na-  
 tas, infestet bestias, seniles, aegrotas et macilentas  
 plane fugiat. Eae, quae sub veris tempore natae,  
 per aestatem subsequenter sub dio pascantur, per  
 omnem

o) Vid. *Contin. II. Tab. IV. Fig. 8.*

p) Vid. eius *S. N. Linnaeani editionem l. c.*

q) Vid. eius *Anfangsgr. der Naturgesch. l. c.*

r) Vid. *Cont. secund. l. c.*



omnem vitam in oestrorum potestate esse, feruntur.  
 his contra animalibus, quae aestatis initio procrean-  
 tur, minus ab his timendum esse, sunt, qui dicant.  
 Haeterum plurimi ruris incolae, animalia, quae sub  
 te huius oestri posteritatem secum ferunt, liben-  
 us illis, quae laruis carent, emunt, vsu quippe  
 docti, illa sana, melius nutrita esse et copiosius lac-  
 raebere. In stabulis animalia haec maxima ex parte  
 his muscis tuta sunt, in pratis campisque vero ab  
 his infestantur, et magis quidem prope sylvas, quam  
 in campis patentibus, aut prope vrbes. Neque vero vno  
 tanto horum oestrorum prouentus est, quam  
 lio. Quodsi oestrus gregi e longinquo appropinquat,  
 quem ex susurrante bene norunt volatu, perturbatur  
 plex et si propius adhuc accedit, omnis, cauda ad-  
 ergum reposita, quantum potest celerrime se in fu-  
 gam dare solet. Quo in furore segetes, frutices,  
 sylvas aut aquam petunt, vbi requiescunt et sic, se ab  
 hoste defendere posse, credunt. Tanto enim a natura  
 hostis insito timore harum muscarum vexantur, vt to-  
 tum gregem disturbare possis, si aut ore, aut alio in-  
 strumento susurrantes oestros imitari scias. Cum  
 igitur, vt supra monui, armenta has muscas tantopere  
 fugiant, et furore percita, huc illuc currant, saepissi-  
 me fit, vt hoc insectum sine proposito non potiatur.  
 Qua de causa multa sic oua perire, oestrumque hunc  
 non tam numerosam producere prolem, quam ex  
 natura fieri possit, clarum est atque perspectum. Ete-

nim ex *Vallisnieri* <sup>s)</sup> asserto septingenta oua in vna eademque femina deprehenduntur.

Qua vero ratione oestrus hic cuti animalium oua sua ingerat, duae feruntur opiniones.

*Vallisnieri* <sup>t)</sup>, *Reaumur* <sup>u)</sup>, *Velthusen* <sup>v)</sup> et plures credunt: bouis oestrus cuti animalis insidere, eam cum corneis vncis, qui in superiore parte antea descripti organi, quo oua eduntur, *Tab. III. Fig. 9. et 10. a. c. a.* eminent, vulnerare et huic vulneri oua inferere sua. Idem viri statuunt, bruta non tantum ex timore, sed potius ex dolore, quem illud organon excitat, eiusque memoria in furorem abripi.

*Linnaeus* contra <sup>w)</sup>, *de Geer* <sup>x)</sup>, *Krünitz* <sup>y)</sup>, *Moeder* <sup>z)</sup> et plures asserunt: hanc muscam perpendicularem bruto imminere et oua ex aëre in cutem ad perpendiculum deiicere. Quod quidem ouum cum glutinosum et ad vulnerandum aptum fit, facile cuti inhaerere posse. Porro affirmant: organon, quo oestri oua faciunt, ad vulnerandum ineptum esse, et, quod caput rei fit, illam opinionem experimentis contradicere. In aprico enim esse contendunt, animalia tenera adhuc aetate, vbi rariores pili et laeues corpori insident, non ab oestris vexari, quoniam oua rebus sic se habentibus locum capere non possint, si ex aëre in cutem deliciantur. Secundo vero aetatis

anno,

s) *Vid. l. c.*      t) *Vid. l. c.*      u) *Vid. l. c.*

v) *Vid. l. c.*      w) *Vid. l. c.*      x) *Vid. l. c.*

y) *Vid. l. c.*      z) *Vid. l. c.*

anno, vbi numerosiores, crispiores atque spissiores  
 pili sint, ouaeque illis facile adglutinari possint:  
 iuvenilia animalia maxime vrgeri. Cum igitur prima  
 etate ex illa opinione musca facilius propter  
 pilorum inopiam, quam sequentibus annis oua cuti  
 pilorum animalium inferre posset; sequeretur, quod  
 tamen veritati contrarium est, animal annum, numero-  
 ri horum ouorum copia, quam biennae vexari debere.

Non audeo, horum virorum eruditorum diri-  
 nere controuersiam; sufficiat argumenta addidisse,  
 quibus priori opinioni arridere moueor.

Haud semper oua in tergo, sed quoque in re-  
 gione lumborum, quid? quod in femore cuti imponit  
 oestrus. Ipse tubercula cutanea, vt vocantur, sub  
 pectore inueni. Quaeritur nunc, quo modo adhuc  
 perueniant oua locum, si ea ad perpendiculum in cutem  
 ex aëre delabi, affirmemus?

Propter externam organi, quo oua deponuntur,  
 naturam corneam et praecipue ob vncos illos corneos  
 et acres, quibus illud organon gaudet, ad vulneran-  
 dum non ineptum esse illud, duco.

Si ex eorum, quos supra laudavi virorum sen-  
 tentia ouum ad vulnus infligendum aptissime a natura  
 formatum est, facilius penetrare poterat tenuibus pilis  
 etiam annuorum cutem, quam biennium magis pilo-  
 sam. Cum vero id contra euenire soleat et oestrus  
 annuis magis, quam adultioribus parcat, necessario  
 aliae adesse debent huius rei causae, quas tamen dili-  
 gentius perscrutari nec lubet, nec vacat.

Si denique oestrus pecora non vulnerat nec vul-  
neri huic ouum immittit, tenuis larua, ouo exclusa,  
fame perit. Hac enim aetate instrumentis, ad ali-  
menta sibi paranda, non est solum fere destituta, sed  
etiam iis uti nescit.

Vnum vero quodlibet ouum, ouale, paululum  
incuruatum atque compressum est. Gaudet superiori  
parte acumine acuto, eminentia quadam ab ouo satis  
distincto. Quae oui pars a similitudine scalpelli non  
plane abhorret, et cum ouo adhaereat, speciem la-  
mellae cultri, manubrio insertae, prae se fert.

Quodsi nunc ex supra allata opinione veritati re-  
spondit, organo, oua excludendo, animalia difficulter ab  
oestro vulnerari posse, ouum tamen cuti immissum, de-  
prehendes, hac ratione fieri censeo. Scilicet muscam,  
cuti insidentem, perdurum ouum, quod nunquam  
non in illo organo maturum solet in promptu esse, et  
quidem acuto eius acumine facile animalium cuti, vel  
poris in cute contentis, satis profunde immittere posse  
opinor. Quo facto ouum humoribus ex vulnere  
paruo promanantibus emollitur et vermis, calore ani-  
mali fetus, ex rima quadam, in oui latere posita et  
tenui membrana intersepta, exit, ouumque relinquit.  
Qui vero vermis siue larua vulnus sensim sensimque dila-  
tat et hac ratione profundius in cutem penetrat, ibique  
ab auctumno usque ad aestatis initium commoratur et  
animalium fluidis nutritur. In prima iuuentute parum  
increscunt, aetate vero prouectiores breui temporis  
inter-



intervallo corporis magnum | faciunt incrementum.  
 hae quidem larvae, quas nos *Engerlinge* appellamus,  
 tubercula illa cutanea, ut vocantur, (*Viehbeulen*, *Daf-*  
*elbeulen*) in boum, vaccarum, ceruorum et caprea-  
 rum coriis efficiunt. Quot enim tubercula in bru-  
 rum cute numeramus, tot etiam inuenimus laruas.  
 Quae enim quaelibet illarum suum pro corporis ratione  
 ut maius aut minus habet domicilium. Eorum sex  
 vel septem iuxta se inuicem posita, vel triginta ad  
 minimum in vno bruto; in ceruorum vero tergo cen-  
 tum et plura haud raro numerantur. Eiusmodi tuber-  
 culum mense Maii vnum et dimidium pollicem lon-  
 gum, vnumque altum *Tab. III. Fig. II.* orificio gau-  
 det, quo in corpus penetrauit larua, *Tab. III. Fig. II. a.*  
 a centro versus tuberculi latus eum in finem a natura  
 remotum est, ut ne larua, quae posteriorem corporis  
 artem, organo inspirationis instructam, huic orificio  
 applicat, ex pluuia et vento corporis detrimentum  
 capiat. Rotundum, quoad diametrum duas tresue  
 lineas amplum et pilis est tectum. Eiusque ope  
 respirat et aluum purgat commodissime. Dum in  
 tuberculo residet larua, humores ad eius nutrimen-  
 tum apti, alliciuntur et effluunt, eo vero relicto, col-  
 labitur, et humores ibidem flagnant. Diebus aliquot  
 traeterlapsis cutis fit integra, cicatricibus vero horum  
 animalium coria deturpantibus relictis. Caeterum  
 laruas non cutem solum et membranam, ut nominant,  
 adiposam, sed musculos etiam cutaneos, siue pan-  
 nicu-

niculum illum carnosum perforare, facile ex iconē *Tab. III. Fig. II. cc. ee. bb. et Tab. IV.* intelligere poterunt Lectores. Hic enim loci et praeprimis *Tab. IV.* a larvis perforatam musculorum cutaneorum siue panniculi carnosī partem ex cerui tergo exsectam, depictam inuenient, vbi, telae cellulosae submusculari in anteriore corporis parte, in posteriore vero illis, iam nominatis partibus inhaerent laruae. Adhuc in iconē illo conspiciuntur loca, e quibus remoueri illas et, vt collapsa foramina, in aspectum veniunt.

Sed me ad earum partes, nunc describendas conuerto.

Mense Iunio laruas corporis incrementum absoluerē, inter omnes constat. Quo facto, quatuordecim vel quindecim longae sunt lineas, earum vero crassities vix septem excurrit lineas. *Tab. I. et II. Fig. 10. 11. 12.* Oblongae et ouales sunt. In iuuentute sordide pallide flauo, paulo post fusco et metamorphoseos tempore fusco nigro, tinctae apparent colore. Tergum aequē, ac abdomen planum, vel potius leuiter est excauatum et totum corpus decem vel duodecim incisuris in totidem partes diuisum. *Tab. I. et II. Fig. 11. et 12.* In quibus nullae spinae, vt ante descriptae, apparent; sed leuia tantum punctula, armato hinc inde cernuntur oculo. Destituta est pedibus, eorum vero loco, tuberculis in lateribus corporis, utitur commodissime. In dextro vero et sinistro latere triplex ordo conspicitur tuberculorum *Tab. I.*

*II. Fig. 10.* quo larua in vtroque latere in sex pars,  
s, siue strias quoad longitudinem diuiditur. Vna-  
aelibet stria tot praedita tuberculis, quot corpus in-  
suris. His in tuberculis varias impressiones et in-  
prema eorum parte gyrum, in eminens acumen  
sinentem, inermis distinguit oculus. *Tab. I. et II.*  
*Fig. 11. ff. gg. et Fig. 12. ee. ff.* Quodsi in animali  
corpore corpus suum larua mouet, stimulo, his du-  
sculis et acribus acuminibus excitato, secretionem  
umorum copiosiore subsequi posse, neminem fore  
ato, qui ueget. Inde nutrimento destitutam lar-  
am nunquam inuenies. Si cum reliquo corpore  
comparamus caput, minus illud *Tab. I et II. Fig. 10. e*  
*Fig. 11. b. Fig. 12. h.* et triplici tuberculorum serie,  
nae capitis voco, circumdatum deprehendes. *Tab.*  
*et II. Fig. 9.* Longitudinali eminentia superiora  
rsus in duas partes, in superiorem scilicet paruam,  
satis magnam inferiorem partem, transuerse diui-  
tur. *Tab. I. et II. Fig. 9 \**. Sub qua eminentia  
ransuerfa longitudinali, in inferiore capitis parte os  
bes, simplici orificio constans. *Tab. I et II. Fig. 9. g.*  
ui proxima sunt duo alia orificia, dextrum scilicet  
sinistrum, quibus expirationem larua promouet.  
traque, vno verbo, organon expirationis voco.  
*Tab. I. et II. Fig. 9. bb.* Circa os et iam descriptum  
rganon adhuc alia inueniuntur tubercula, quae, vt ab  
iis distingui possint, capitis interiora appellari liceant.  
*Tab. I. et II. Fig. 9. a.* Omnia capitis tubercula, praeter  
gyros

gyros istos, minutissimis spinis, eum fortassis in finem exornata esse, moneo, vt vehementiori stimulo, a larva his partibus excitato, esuriente, copiosior humorum alliciatur affluxus. Hamulos deinde incuruatos corneos, quibus oestri ouini larua vtitur *Tab. I et II. Fig. 3. d. d. et Tab. III. Fig. 1.* in his plane desideravi, qua de causa has molestius mouere corpus et difficilius in cutem animantium penetrare posse, facile est intellectū. Caeterum acinos sensorios, in reliquis oestrorum larvis deprehensos, detegere in his frustra sum conatus. *Tab. I et II. Fig. 3. e. e.* Aut eos inter capitis tubercula numerosiora latere, aut minores esse, quam vt conspici possint, aut denique huic laruarum speciei plane deesse et aliis sentiendi organis has laruas, exstructas esse, suspicor. Pro lubitu caput protrudere et ab imminente periculo retrahere posse in corpus, illud est, quod adhuc notandum esse, puto.

Anteriore posterior corporis pars maior est et crassior. Iam inermi oculo duō cornea, fusco nigra, corpora semicircularia, duobus cornubus versus se invicem posita, distinguuntur. *Tab. I et II. Fig. 8. b. b.* Sunt intra haec duo orificia, quae ex dimidia parte a duobus vniuscuiusque corporis semicircularis cornubus comprehenduntur et quorum ope inspirat larua. Partes igitur has nomine organi inspirationis insignire, lubet. *Tab. I et II. Fig. 8. c. c.* Supra haec aliud foramen conspicitur maius et re vera anus esse creditur. *Tab. I et II. Fig. 8. e.* Omnes has in posteriori corporis parte contentas, ad facilius inspirandum, com-



immodiusque aluum leuandum, orificio', vt supra  
 n monui, tuberculi cutanei applicat. Quem corporis  
 um, si negligit larua, vel externa vi ad tempus  
 itare cogitur, suffocatione perit, praesertim cum a  
 tura, vt aliae insectorum laruae, orificiis inspiratio-  
 lateralibus sit destituta. Quodsi nunc subtili satis  
 ltro transuerse discinduntur illa corpuscula semicir-  
 laria, nouas intus partes obseruare licet. Scilicet  
 rpora ipsa minora et quoad figuram mutata, in me-  
 eorum parte duo inspirationis orificia, quae multis  
 ciisque ramis arboraceis, colore grate flauo tinctis,  
 aguntur, deprehendes. *Tab. I et II. Fig. 6. b. b.*  
*c. c. c. c.* Quod si paulo profundius illa corpuscula  
 micircularia, transuerse disecare pergis, ea concavam  
 infundibulo similem formam atque mirifice intus  
 iatam habere, obseruabis. *Tab. I et II. Fig. 7. bb.*  
 x cauis hisce, vel si mauis, ex duobus infundibulis  
 iuntur atque in corpus prolongantur canales illi aërei.  
*Tab. I et II. Fig. 7. cc. et a.* Hae igitur partes laruarum  
 trum externae, aut nudo, aut armato oculo poterant ob-  
 ruari. Nunc de cute moneo hoc tantum, eam arctius  
 tuam vestire, satis pellucidam esse, et insigniori adhuc,  
 am quae oestri ouis laruis propria erat, praeditam esse  
 elastica. Colorem denique naturalem et cutis et inte-  
 rum partium omnium, aqua, vel spiritu vini submersa-  
 m mutare in nigrum eundem colorem hisce fluidis  
 buere, notatu dignum esse censeo.

Quod reliquum est, non ob angustiores solum huius tractationis fines, sed etiam ob similitudinem, quae inter interiores et nostrae et illius laruae ouinae, laruae partes intercedit, ab earum ulteriori descriptione abstineo. Hoc vero addere liceat: nostrae laruae organon inspirationis cum basi sua tribus adhaerere radicibus cartilagineis, quae interiora versus *Tab. III. Fig. 3. b. b.* eodem modo, quo finiuntur laruae ouinae hamuli incuruati, terminantur. *Tab. III. Fig. 1. b. b.* Porro ventriculorum prope duas adesse vesiculas, fluido pellucido repletas, quarum vero neque functionem describere, neque usum suspicari sustineo. Sed de corporis partibus haec sufficiant. Accedo nunc ad laruarum quasdam functiones.

Cum fere eodem in loco, ubi primo vitae tempore exclusa iacebat, larua nostra commorari possit, satis perspicuum est, ei, ad alimenta sibi comparanda, altius in corpus animale penetrare, haud opus esse. Fere igitur repere et corpus mouere nescit. Attamen metamorphoseos tempore ex naturae legibus pristinum locum derelinquere et corporis motus rependo tentare cogitur. Quodsi vero derelinquere cupit, hac ratione utitur. Posteriore scilicet corporis parte tuberculi cutanei orificium dilatare conatur ita, ut parvam corporis partem per illud protrudat. Quo facto hanc retrahit et quiescit. Paulo post repetit experimentum, nec abstinere, usque dum tertia corporis parte, quod intra aliquot dies fit, orificii illius angustiam

nam superauerit. His peractis duas contrahit partes  
 rtias, in corpore animali adhuc latentes et sic felici  
 um successu e tuberculo cutaneo exit. Matutino tem-  
 ore hora octaua ad decimam vsque, quibus aëri at-  
 osphaerico gratus est calor, haec foras prodeundi  
 ericula facere laruam, nos edocent diligentiores  
 economiae studiosi. Derelicto nunc corpore animali  
 terram delabitur et commode ac lente proxime ad-  
 centem lapidem, siue glebam, vbi se abdere queat, pe-  
 . In terram, vt aliae oestrorum laruae, eam ob cau-  
 m sese non abscondit, quia aptis caret terram foden-  
 im instrumentis, hamulis scilicet et spinis corneis.  
 ocum commodiorem adepta, quiescit et intra aliquot  
 tes in imaginem mutatur, quam alibi <sup>a)</sup> delineatam  
 que depictam inuenient Lectores. Quae imago ali-  
 na ex parte prae se laruae speciem fert, colore ex-  
 pto, qui in hac ex fusco rubro nigricans offenditur.  
 ute externa corrugefacta atque deposita, noua, ima-  
 nem vndiquaque vestiens, exoritur, sub qua iterum  
 ia omnes imaginis partes interiores leuiter interse-  
 tens, a natura producit. Intra aliquot hebdoma-  
 es, aperta triangulari anteriora versus prope tergum  
 aginis parte, et hac ratione tertio inuolucro relicto  
 codit oestrus bouinus.

Ab ouinis vero laruis nostra hac ratione differt  
 licet haec quatuordecim lineas longa et se-  
 em crassa, illa vix ac ne vix quidem, quoad longi-

D 2

tudinem

a) Vid. Contin. II. Tab. IV. Fig 10.

itudinem pollicem vnum et quoad crassitiem quatuor lineas superat.

Haec in tergo aequae, ac in abdomine plana et leuiter tantum excauata est, illa vero insigni tergo conuexitate gaudet.

Huius corpus in decem vel duodecim partes diuisum, illius vero tantum in decem distinctumprehendes.

Haec in capite tantum spinis et quidem minutissimis, illa vero in omnibus corporis infectionibus iisdem, satis perspicuis, est obsita.

Haec in utroque corporis latere, dextro atque sinistro, tres tuberculorum ordines, illa vero vnum tantum eorum habet.

Huius tubercula mirifice sunt incisa et in acuminem, satis acuto, desinunt, illius vero tubercula spinis obsita apparent.

Huius expirationis organon ex duobus, illius vero ex vno, eoque simplici constat orificio.

Haec vnico oris orificio, illa duobus est praedita.

Haec hamulis incuruatis corneis, quibus illa gaudet, plane caret.

Huius acini sensorii latent, cum apud illam iideratis sint conspiciui.

Huic inspirationis organon compositum, illius vero simplex idem est.



Huius denique ani orificium versus tergum, illud versus abdomen positum est.

Sed sufficientia criteria haec extrinsecus a larvarum corpore decerpta. Si lubeat et postulet res, plura addere potuerim; ne vero Lectorum patientia abuti videar, haec satis dicta sunt.

Ad alias potius res transeo, forsan ad usum praetantiores. Disputare enim de remediis, quorum ope hospites hi nociferi ex corpore animali sunt expellendi, apud animum constitui meum.

Opinionem falsam vanamque esse, qua statuitur; pruta, ab his larvis vexata, bene esse nutrita et lac opiosius praebere, ob numerosam horum vermium opiam, vnumquemque, paulo diligentius rem considerantem utraque largiturum manu credo. Nam omnes quidem oestros sana et optime nutrita eligere ibi animalia ad ova ibi reponenda, in dubium vocari nequit, sed hoc iure meritoque negatur, in larvarum praesentia causam pinguedinis esse reponendam, cum ea, quae ab hisce hospitibus liberantur, pinguiora adhuc fore, experientia edocti videamus. Cui sententiae applaudunt carnis ceruinæ venditores, non ignari, ceruos, a numerosa larvarum copia cruciatos, non toria solum fere nullius pretii, sed carnem etiam habere macilentam. Hinc paucas tantum larvas parum nocere posse animalibus, libens quidem libensque

concedo, sed plures admodum esse noxias contendo. Etenim praeternaturali stimulo, a larvis excitato, humores animales in loca alliciuntur, vbi in detrimentum animalis oeconomiae affatim consumuntur, aut stagnant et deprauantur. Igitur circulus sanguinis impeditur et praeterea nerui perpetuo acri stimulo irritantur. Quas res corpori haud conducere, et is intelliget, qui a medicina est alienus. Inflammationum enim et vlcerum malignorum, quid? quod gangraenae exempla, haud rara, inde originem trahunt suam. Operis ideo, cum de remediis, contra has laruas in usum vocandis, meditari suscipio, pretium facturus esse mihi videor. Mediorum vero duplex ratio est. Scilicet cauendum est, ne animalia infestet oestrus, deinde, vt laruae e corpore remoueantur, omnis adhibenda est diligentia. Prius aut plane non fieri, aut saltem cum maxima molestia peragi posse, affirmo Pastoribus equidem, vt impediant, quominus aestatis tempore, bruta infestet oestrus, duplicem mercedem persoluerunt veteres ruris cultores, sed num sine sint potiti suo, dubius ancepsque haereo. Interea et hodie variis mediis a brutis detinere oestrum conantur nonnulli oeconomiae studiosi. Regionum septentrionalium incolae pecorum cutem aut phocarum adipem aut oleo, ex balaenis excocto, obliniunt. Nostri vero oeconomi aut sal culinare in tergum dispergunt, aut lardo cutem sic inungunt, vt pili nitentes arctius tergo applicentur, opinantes, se ratione hac a brutis oestrum

oestrum detinere posse. Sed omnia haec et reliqua  
 morum remediorum caterua frustraneo conatu contra  
 oestrum in auxilium vocari, arbitror. Igitur alteri  
 viae insistendum et larvas e cute omni adhibita dili-  
 gentia extrahendas, puto. Eum in finem auctumno  
 ad iuuenilia bruta attendere et si tuberculum cutaneum  
 hoc tempore paruum deprehendimus, molli id adipe  
 vel calefacto oleo inungere debemus, quo facto cutis  
 eleuanda et pollice indiceque digito adhibito, tubercu-  
 lum sic comprimendum est, vt larua prodire cogatur.  
 Quodsi vero, cum iuuenis larua fenili arctius cuti ad-  
 hereat, propter dolorem animalia hanc curationem  
 respuant, aut acu, vel alio acri instrumento per tu-  
 berculi orificium patulum laruam perfodere, aut flui-  
 dis corporibus resinosis, vel tenaciori rancidoque oleo  
 satis diligenter et repetita vice orificia illa oblinire at-  
 que obstruere debemus, quo facto, vel vulnere illa-  
 to, vel suffocatione perit larua. Paulo post a natura  
 eiicitur et sic a vita perquam molesta liberantur anima-  
 lia. In Africa avis, Buphaga, vt vocatur <sup>b)</sup>, summo  
 cum studio in brutorum tergis larvas, quae ei in de-  
 liciis sunt, explorare, easque, rostri sui artificio, fa-  
 cile et mirum in modum e cute extrahere fertur.

Sed haec sufficiant. De reliquis oestri speciebus non  
 nulla adhuc in promptu erant: ne vero Lectorum eru-

D 4

ditilli-

<sup>b)</sup> Vid. BRISSON Ornithol. 2. p. 457.

ditissimorum patientia abutar, alii opportuno scribendi tempori ea omnia relinquere constitui. Nunc nihil amplius additurus, nisi preces humanissimas, velint hoc quaecunque observationum specimen Lectores humaniter excipere, mihi quae minus recte exciderint dicta, beneuole condonare.

## EXPLICATIO TABVLARVM.

*Tab. I.* Exhibet et oestri ouini et bouini laruarum partium sciagraphiam.

*Fig. I.* Repraesentat naturalem magnitudinem laruae oestri ouis sic, vt eius tergum in oculos incurrat.

*a.* Eius caput, siue pars corporis anterior.

*b.* Pars corporis posterior, organon inspirationis continens.

*cc.* Corpora semilunaria, siue semicircularia cornea, organi inspirationis pars praecipua.

*dd.* Tubercula lateralia, spinis corneis obsita.

*ee. ee.* Decem corporis incisurae semicirculares spinis numerosis exornatae.

*ff.* Intestinum.

*Fig. 2.* Eadem larua ex opposito latere conspecta.

*a.* Eius caput, siue pars corporis anterior.

*b.* Pars corporis posterior.

*cc. cc.* De-



# Tab. I.

Fig. IV.



Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.




Fig. V.




Fig. VI.




Fig. VIII.




Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.




Fig. XI.



Fig. XII.



Ad nat. del. et sculpsr.  
Auctor.



*cc. cc.* Decem incisurae numerosis spinis obsitae.

*dd.* Intestinum.

*ee. ee.* Tubercula lateralia, pluribus spinis exornata.

*Fig. 3.* Pars huius laruae anterior, siue caput, opticae lentis ope admodum aucta.

*a.* Organi exspirationis orificium.

*bb.* Duo hamulorum incuruatorum processus concaui, oesophagum in utroque latere excipientes.

*cc.* Duo oris orificia in oesophagos desinentia.

*dd.* Duo hamuli incuruati cornei.

*ee.* Acini sensorii, siue duo corpuscula organon sensus constituentia.

*ff.* Basis capitis multis spinis corneis minutissimis obsita.

*g.* Eminentia intra organon sensus posita atque partem capitis supremam constituens.

*Fig. 4.* Pars huius laruae posterior eadem lente aucta.

*a.* Organon inspirationis, siue eius orificium inferius.

*bb.* Corpora duo semilunaria, cornea, striata.

*cc.* Duo organi inspirationis orificia superiora.

*dd.* Magna eminentia, totam hanc corporis partem posteriorem cingens.

*ee.* Paruae laterales eminentiae rotundae et

gg. Eminentia satis longa. Hae eminentiae quatuor sulcū formant ad recipiendum

f. Orificium ani.

Fig. 5. Repraesentat huius laruae in tergo apertum, et microscopio auctum corpus.

a. Denotat caput, siue anteriorem corporis partem.

bb. Acinos sensorios, siue organon sensus.

cc. Duos ventriculos in

dd. Intestina desinentes.

ee. Striam carnosam vel muscularem superiorem et

ff. Eandem inferiorem.

gg. Vasorum aëreorum ramos.

hh. Vasa, siue canales aëreos.

ii. Partem corporis posteriorem.

k. Intestinum satis magnum.

Fig. 6. Laruae oestri bouis organon inspirationis, siue partem corporis posteriorem admodum auctam et cultro anatomico dissectam demonstrat.

a. Orificium ani.

bb. Duo orificia inspirationis in corporibus semilunaribus posita.

cc. cc. Ramos arboraceos suaue flauos, corpora haec cingentes.

Fig. 7. Idem inspirationis organon sistit, paulo inferiori vero loco eum in finem dissectum, ut intimae eiusdem structurae ratio in adspectum veniret.

a. Ori-



- a. Orificium ani.
- b. Corpora semilunaria iam nunc infundibuli infundibuli excavata.

cc. Duo inspirationis orificia.

*Fig. 8.* Offert eandem partem eiusdem laruae inferiorem, satis auctam, organon inspirationis cum orificio ani continentem.

- a. Pars corporis tergum versus spectans.
- bb. Duo corpora semilunaria, cornea.
- cc. Duo organi inspirationis orificia.
- dd. Pars corporis abdomen versus respiciens.
- e. Orificium ani.

*Fig. 9.* Repraesentat caput, siue partem laruae bovis anteriorem, a fronte delineatam et microscopio auctam.

- a. Tubercula capitis interiora.
- bb. Duo orificia organon expirationis continentia.
- cc. Tubercula in suprema capitis regione posita, minutissimis spinis obsita.
- dd. Tubercula capitis interna, siue tertii ordinis.
- ee. Tubercula capitis media, siue secundi ordinis.
- ff. Tubercula capitis externa, siue primi ordinis.

g. Orificium oris.

\*) Eminentia longitudinalis transuersa, caput in superiorem et partem inferiorem diuidens.

*Fig. 10.*

*Fig. 10.* Larua oestri bouis naturali magnitudine a latere visa ita, ut triplex tuberculorum lateralium ordo manifestior fiat.

*a.* Posterior capitis pars, anum et organon inspirationis includens.

*bb. bb.* Incisurae corporis decem, exceptis illis, quae superiora et inferiora versus latent.

*cc.* Ordo tuberculorum medius.

*dd.* Ordo tuberculorum lateralis dexter atque sinister.

*e.* Caput, siue corporis pars anterior, os et organon expirationis comprehendens.

*f.* Corporis regio abdomen versus spectans.

*g.* Regio versus tergum respiciens.

*hh.* Gyri tuberculorum lateralium.

**\*\***) Gyri tuberculorum ordinis medii.

*Fig. 11.* Eiusmodi larua a tergo depicta.

*a.* Pars corporis posterior.

*b.* Pars corporis anterior.

*cc. cc.* Decem incisurae.

*dd.* Tubercula lateralia interna.

*ee.* Tubercula lateralia externa.

*ff.* Gyri in tuberculis lateralibus externis.

*gg.* Gyri in tuberculis lateralibus internis.

*Fig. 12.* Eiusmodi larua, sic vero delineata, ut abdominis regio conspici possit.

*a.* Pars corporis posterior.

*bb. bb.* Incisurae illae decem.

*cc. Tu.*



Tab. III.

Fig. VIII.



Fig. IX.




Fig. V.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. XI.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. II.



Fig. X.



Fig. II.







*Tab. II.*

*Fig. II.*

*Fig. I.*

*Fig. IV.*


*Fig. III.*



*Fig. V.*

*Fig. VI.*

*Fig. VII.*



*Fig. VIII.*

*Fig. IX.*




*Fig. X.*



*Fig. XI.*

*Fig. XII.*



*Del. et sc. Auder.*

cc. Tubercula lateralìa externa.

dd. Eadem interna.

ee. Gyri in tuberculis lateralibus externis.

ff. Idem in internis.

gg. Sulci et rimae, quibus tota abdominis superficies diuisa est.

h. Pars corporis anterior.

## TAB. II.

Easdem continet laruarum partes, quae ob numerosam notarum signorumque copiam in antecedente tabula non tam accurate et diligenter satis, vt in hac factum esse, apparet; depingi poterant.

## TAB. III.

Repraesentat alias adhuc laruarum, et oestri ouini et bouini praesertim partes, lente optica auctas.

*Fig. 1.* Pars capitis ex larua ouini oestri decerpta et admodum aucta, hamuli scilicet incuruati, qui *Tab. I. Fig. 3. dd.* iam iam in naturali situ depicti occurrunt.

aa. Hamuli iuxta se inuicem positi et aequales.

bb. Radices quatuor cartilagineae albiae, in quas exeunt. Antiores et posteriores.

cc. Processus siue protuberantiae in vnoquoque exemplo duae.

*Fig. c.*

*Fig. 2.* Declarat rationem et situm spinarum cornearum in larvarum corpore. Est admodum aucta pars corporis ouinae larvæ; ex regione abdominis desumpta.

*aa.* Superior spinarum.

*bb.* Inferior illarum numerus.

*Fig. 3.* Sistit intimam organi inspirationis larvæ oestri bouini structuram.

*a.* Organon inspirationis cum annexis corporibus semilunaribus.

*bb.* Quatuor radices cartilagineae, albidæ, in quibus partes hae terminantur.

*Fig. 4.* Demonstrat systema nervosum ex ouini oestri larua depromptum.

*aa.* Sunt acini illi sensorii, siue organon sensus.

*bb.* Duo trunci nervosi.

*cc.* Rami nervosi interni sine pari.

*dd. dd.* Rami et furculi nervosi externi.

*Fig. 5.* Sistit feminam oestri bouis microscopio auctam.

*a.* Antenna in setam desinens.

*b.* Oculus dexter.

*c.* Instrumentum, quo ova deponit sua, (*Eierleger, Legeſtachel.*)

*d.* Squamulae, sub quibus halteres.

*ee.* Partes alarum pellucidae.

*ff.* Earundem partes opacae.

*Fig. 6.* Pars eiusdem oestri superior siue thorax microscopio auctus.

*aa.* Duo



*aa.* Duo maiores oculi et iuxta hos tres minores,celli dicti.

*bb.* Canales aperti, siue fulci excavati, pilis multobstiti.

*Fig. 7.* Eiusdem partis oppositum latus repraesentat.

*aa.* Maiores oculi sunt.

*b.* Antennae in orbitis. Sub his reperitur foramen pilis obseptum.

*Fig. 8.* Sistit antennam ex capite cum orbita sua tectam.

*a.* Antenna in orbita.

*b.* Seta, in quam exit.

*Fig. 9.* Declarat rationem, qua larva oestri boni in tuberculo cutaneo (*Viehbeule*) sedem figeret suam. Quod tuberculum transuersim dissectum habes.

*a.* Huius est tuberculi introitus, siue eius orificium patulum.

*bb.* Contextus cellulosus corruptus.

*cc.* Cutis pars.

*dd.* Pili cutanei.

*ee.* Pars musculi cutanei, siue panniculi carnos.

*Fig. 10.* Superior pars instrumenti, cuius opera excludit oestrus bonis sua.

*a. c. a.* Tres vnci, siue hamuli, in quos exit.

*ee.* Inuolucrum corneum fuscum.

*b.* Canalis, quo deponuntur oua.

*Fig. 11.*

*Fig. II.* Instrumentum, quo oestrus oua deponit et excrementa eiicit sua: admodum auctum est,

*a. c. a.* Sunt tres illi vnci, siue hamuli.

*bbb. bbb* Inuolucra illa fusca cornea, in quibus canalis, ouis deponendis destinatus, latet.

*dd.* Basis huius instrumenti pilis tecta.

*ee.* Suprema, in duas iterum easque diuisas partes exiens pars.

#### TAB. IV.

Laruarum oestri bouis in musculo cutaneo, siue panniculo carnosio sedem repraesentat. Exsecta est haec pars e tergo cerui, a multis et numerosis hisce laruis cruciati, atque eum in finem a me delineata, ut accurate satis horum vermium oeconomiam intelligant Lectores.







# OBSERVATIONES DE TAENIA HYDATIGENA IN CARNE SVIS NVPER INVENTA.

Haud sine animi voluptate, me nuperrime vermem hunc, quem vulgo *finnam* appellant, quemque Cel. GOETZIVS<sup>a)</sup> atque OTTO FABRICIVS<sup>b)</sup> emortuum tantum viderunt, viuum, saluum et incolumem videre, memini. Cum vero in partibus eius describendis et depingendis apud illos duumuiros cel. singularis obseruatur dissensus, et cum, quod ego de vermibus huius structura, dum viuus erat, obseruavi, illorum effatis non semper conueniat; hic loci vltiorem de finna sermone[m] facere, haud ab argumento meo alienum esse duxi. Longe equidem absum, ut putem, me leuibus hisce obseruatiunculis, quas viris illis lectoribusque diiudicandas offero, docere illos posse, quid ipsis in posterum de hoc verme statuendum sit: id potius volo, ut habeant, quod ego vidi, et quomodo obseruationes institui meas.

Inter lanios constat, si cum sanguine ex vulnere sui inflicto profluente, corpuscula (rotunda<sup>c)</sup>), instar milii

a) Vid. eius *Neueste Entdeckung, dass die Finnen im Schweinefleisch etc.* Halle 1784.

b) *Nou. Act. Socier. Hafn.* Tom. II. p. 287. et *Deutsches gemeinnütziges Magazin.* Jahrg. II. Quartal. I. Leipzig 1788.

c) Corpuscula illa finnae sunt in semet ipsae repositae vesica vero tumesciente interna destitutae. Caeterum

milii granorum, promanant, finnoso morbo laborare animal. Cui rei, quae certum istis hominibus morbi huius criterium praebet, quod taeniam nostram viuam viderim, debeo. Vix enim lanus quidam, quocum de finnis saepius sermonem serui corpuscula illa in sanguine suis iugulati animaduertit, cum me de re hac certiores factum, ut ad ipsum statim venirem, inuitaret. Videbam equidem tunc corpuscula illa miliformia calido sanguini, absque tamen vitae indicio, innatare. Sectione suis statim instituta, viscera pectoris et abdominis sana esse et ab omnibus vermibus intestinalibus libera inueni.

Hepar praeprimis egregie rubescebat et ne minimum taeniae granulosa illius vestigium<sup>d)</sup>, si paucis excipis callosa loca in eius superficie anteriore posita, exhibebat. His interioribus partibus attente disquisitis, ad carnes adieci animum et cum his numerosas inesse finnas intelligerem, partem quandam ex regione colli excindendam curavi. Quam nactus in duas partes diuisi, quarum alteram aquae calidae, quae apud manus erat, immisi, alteram, calore animali adhuc  
prae-

vermes hos, lanii cultro illaesos, non in sanguine, quocum promanant, residere, sed ex carne, cultro, quo vulnus infligitur animali, abripi et proficiente sanguine provenire credas.

d) Vid. *Versuch einer Naturg. der Eingew. von I. A. E. Goetze*, p. 258. *Tab. 20. B. Fig. 9. 14.* et eius *Neueste Entdeckung etc.* p. 30.

caeditam, statim examini subieci meo. Primum in  
 ulos incurrabant inter fibrarum muscularium strata  
 inter illa praeprimis, quibus intertexta erat copiosa  
 anguedo, vesiculae <sup>e</sup>). Quas vesiculas numerosas  
 eisdem esse, quas Cel. GOETZIVS descripsit <sup>f</sup>), statim  
 intellexi. Scilicet ouales erant, solitariae, et fluido  
 teroquin limpido turgescabant. Leuem in iis, si  
 vernis huius pars intacta jacebat, animaduerti, tre-  
 moris instar motum, eundem vero admissa vesicae  
 ris halitu aut digito euanescere sensi. Experimento  
 hoc ter quaterque repetito paulo post omnis in illis  
 erit motus, neque vlla arte denuo excitari potuit.  
 iis vero, quas aqua calida submersi periculum hoc  
 cepius et ita repetere potui, vt mihi de hoc vitae  
 gno grauitèr antea dubitanti nunc nullum amplius  
 peresset dubium.

Quid igitur valeat suavis calor, quid aëris atmo-  
 sphaerici aditus ad conseruandam destruendamue huius  
 vernis vitae, abunde inde patet. Dum vero hoc pera-  
 rebam, finnam nostram per vesicam tantum obscure  
 perlucens vidi: eius autem interiorem structuram  
 ue vsque non eram rimatus. Quapropter omnem  
 conseruendis e carne vesiculis, vt scilicet vermis oeco-  
 nomiam formamque accuratius cognoscerem, adhi-

E 2

bui

e) Firmas equidem inter strata fibrarum carnis pinguiora  
 petere loca vidi, quas tamen in lardo aliisque locis  
 pinguibus a carne remotis frustra quaesui.

f) Vid. eins *Neueste Entdeckung* etc. p. 9.

bui diligentiam. Sed singulari molestia id fieri poterat. Tam arcte enim et firme cum carue, textus cellulosi ope, cohaeret, ut, antequam excutatur, cultro vesica non raro destruat anatomico. Nihilominus minus non nullas salvas, integrasque effodi, quas attamen nec hoc in statu rite satis observare potui. Instrumenti igitur acutissimi eiusdemque subtilissimi ope hanc vesiculam incidere studui. Quo facto sub hac adhuc aliam adesse vesicam intellexi. Cum igitur illam totam diffecarem luce meridiana clarius vidi, vermem hunc, ut finnam humanam <sup>g)</sup>, praeditum esse externa vesica, internam vnde quaque aequaliter cingente. Inde igitur in cellulis tantum residere finnam, ut Cel. GOETZIVS contendit <sup>h)</sup>, experientia edoctus modeste nego. Praeterea adhuc moneo, vesicam hanc, quam externam, siue communem voco, contextam esse ex tela illa cellulosa, carnis fibras eiusque strata connectente. Caeterum extrinsecus glabra est et aspera, intrinsecus vero satis polita, lacuis, et minori copia serosi, quod continet liquidi, semper madida. Densa et elastica est. Felici iniectione vaporum facta, ad hanc et arterias et venas, ut in finna humana <sup>i)</sup>, serpere vidi, quae in vesicam externam succum aduehant reuehantque taeniae nutritium.

Qui

g) Vid. hui. libr. continuat. secund. p. 10. not. V. et. R.

h) Vid. eius *Neueste Entdeckung etc.* p. 9 et 10.

i) Vid. hui. libr. contin. secund. Tab. I. Fig. 1. b.



si ubi aduenit, caput longe lateque protendit ver-  
 s ex vesica interna et alimenta capit sua. Quod si  
 co non sua sponte adfluant humores, stimulante  
 bite protruso ad illam maiorem allicit humorum  
 fluxum. Tali modo a natura nutritur vermis vesica  
 adeoque firme inclusus. Ex his, ut equidem  
 to, satis elucet, vermem nostrum neque locum  
 uere posse suum, neque horum animalium carnes  
 fodere. Opinionem hanc, cui Cel. OTTO FABRICIUS  
 plaudit, qui inde vitam quoque porcorum finno-  
 rum inquietam pendere censet, fictam vanamque  
 te puto <sup>k</sup>). Sed redeo ad vesicam externam, cui  
 vulnus infligitur, interna, seroso liquido admodum  
 tensa prodit. Scilicet ex apertura statim et cum im-  
 tu quodam prouenit, ita ut absque vlla molestia  
 za extrahi possit. Quae quidem interior vesica,  
 dem quidem cum exteriori forma, illa tamen mi-  
 or, finnam continet et membrana pellucida eadem-  
 ae subtilissima constat. Dum viuit vermis, subrubro  
 tenditur sero. Lympham coeruleam hoc in statu  
 prehendi in illa nunquam <sup>l</sup>). In humore hoc,  
 microscopio subiecto, ne vllum structurae organicae  
 stigium, si illos exeeperis vulgares globulos, de-  
 gere potui. At membranam, qua haec vesica com-  
 onitur sub lente, cuius focus lineam vnam aequa-  
 et, admodum porosam et ad similitudinem pulpae  
 E 3 fam-

<sup>k</sup>) Vid. l. c.

<sup>l</sup>) Vid. *Neueste Entdeckung* etc. p. 9 et 11.

sambuci nigrae, sub microscopio auctae, constructam esse, vidi. Inde patet, et resorbere illam humores, vt spongiam, posse. In interiore vesicae parte, et in margine quidem superiore longo <sup>m)</sup>, taenia sub forma corpuseuli rotundi haeret; eodem igitur loco eademque ratione, vt humana <sup>n)</sup>. Cum membrana vesicae sub annuli forma arcte firmeque cohaeret sic tamen, vt centralis huius annuli pars, quam taeniae extremum explet, ab illa libera sit membrana. Quodsi igitur ab hocce loco remoueris finnam, hic vesicam perforatam esse inuenies. Tali modo in hanc intrare, iterumque ex illa potest exire taenia. Retrasta finna, illo loco rima siue fossa <sup>o)</sup> in adspectum venit, quae vbi quaedam corporis pars prodiit, euanescit, et illius loco eminentia corporis cernitur <sup>p)</sup>. Foramen hoc cum illo, quod Cel. FABRICIVS <sup>q)</sup> descripsit atque depinxit vnum idemque esse, in multis variisque experimentis edoctus scio. Cum enim ex vesica externa exsectas vesiculas aquae calidae immitterem, sponte sua ex hoc vermem egredientem vidi. Quodsi vero calidam cum frigida commutavi aquam, per idem statim sese retrahebat finna. Etsi vero omnem in hoc explorando hac ratione foramine posuerim operam, tamen alia adhuc via et aliis periculis

me

m) Vid. *Tab. V. Fig. 4. 5. 6. 7. 8. a. b.*

n) Vid. *Contin. Secund. Tab. I. Fig. 4. 5.*

o) Vid. *Tab. V. Fig. 5. a.*

p) Vid. *Tab. V. Fig. 6. a.*

q) Vid. *l. c. Fig. 1. 2. 3. ddd.*

ne certissimum facere conatus sum. Scilicet turgida  
 lam et vermem qui sese intra illam receperat, conti-  
 nentem vesicam apici pollicis imponebam, deinde  
 apice digiti indicis leuiter corpusculum illud rotun-  
 dum, sic tamen premebam, vt ad orificium illud  
 liber semper aditus pateret. Quo facto paulo post  
 eundem sonitum leuem audiui, quem Cel. GOETZIVS<sup>r)</sup>  
 iam olim animaduertit, et finnam ex eodem fora-  
 mine, quod supra descripsi, prodire vidi<sup>s)</sup>. Sic  
 nunc de foramine illo, vt equidem putaui, satis edo-  
 ctus eram. Dum vero haec repetii experimenta,  
 accidit, vt grauiori pressione adhibita disrumpe-  
 retur vesica. Cum iam omne illa contentum serum  
 efflueret, collabebatur illa, et en! statim finna, lobis,  
 quos vidit et descripsit FABRICIVS<sup>t)</sup>, praedita, effor-  
 mata erat. Quo quidem experimento repetito, lobos  
 hos ex vesicae disruptae extremitatibus originem tra-  
 here expertus sum. Si igitur duae extremitates in  
 vnum eundemque locum coincidunt, oritur finna  
 vno lobo praedita<sup>u)</sup>, si in duas, duobus gaudet<sup>v)</sup>.  
 Ex his igitur satis elucet, finnam lobatam taeniam  
 esse laesam, neque integram, vt vir ille celeberrimus  
 affirmat. Sed et adhuc alio experimento dubitanti  
 mihi probare sententiae huius veritatem studui. Sci-

E 4

licet

r) Vid. *l. c. p. 15.*s) Vid. *Tab. V. Fig. 7. a.*t) Vid. *l. c.*u) Vid. *Tab. V. Fig. 3. b.*v) Vid. *Tab. V. Fig. 1. et 2. bb.*

licet recordabar animo meo, easdem taeniās lobatas me vidisse supra sanguinem porci, de quo paulo ante sermo fuit, natantes, easdemque inuenisse olim in carne finnosa apud lanios. Tales igitur nunc mihi comparare studebam. Voto potitus has lobatas numerosas finnas in tota carnis superficie, in interiore vero eius substantia illaesas multas, id est vesicis sero repletis instructas inueni, quas omnes per aliquot dies aëri atmospherico exponebam. Paulo post vesiculas illas turgidas, flaccescere et deinde sero vacuas, penitus collabi et in lobatas finnas efformari obseruaui. Ex experimentis his sensim sensimque institutis satis originem et naturam loborum *Fabricianorum* intellexi. Nam ortum aut euidam violentiae, aut exsiccati aëri debere vidi. Inde finnarum descriptionem, atque delineationem quam nobiscum communicauit FABRICIVS <sup>w)</sup>, GOETZIANA <sup>x)</sup>, magis a natura abhorrere, clarum atque perspectum esse videtur. Acutissimus enim ille rerum indagator finnas vel diu iam mortuas, vel laesas, GOETZIVS contra ea recens defunctas, saltem integras obseruauit. Inde magnum inter descriptiones ab utroque naturae indagatore exhibitas discrimen, de quo FABRICIVS ipse sermonem fecit, cuiusque causam in instrumento illo, quo GOETZIVS vsus est, pressorio quaesiuit.

Sed reuertor, vnde digressus sum, et ob temporis angustiam ad tractationem aliam <sup>y)</sup>, vbi fusius de-

w) Vid. l. c.

x) Vid. l. c.

y) Vid. *Geheimnissiges deutsches Magazin*, 2. Jahrgang, 1. Quartal, 1788.



emonstrare conatus sunt, quomodo et aliae res huc pertinentes se habeant, lectores ablego.

Qua iam ratione taenia nostra ex vesica progreditur, eadem corpusculum illud subrotundum ambitu minuitur suo; et, cum tota exiit, ne vllum illius vestigium videbis. Cum vero hoc in statu egregie cerni possit, quomodo taenia cum vesica cohaereat, non est, quod mireris, me contendere illam tantum corporis quasi appendicem, neque, vt FABRICIVS opinatur <sup>2)</sup>, partem eius esse essentialem. Finnae enim, ubi vel imminenti periculo sese subtrahere, vel requiem dare studet, tutum offert refugium. Etenim non sustineo adfirmare, experimentis destitutus, an ex hac parte maiorem adhuc vtilitatem finna capiat, nec ne. Caeterum hac occasione oblata non potui non, quin eadem pericula, de vitae huius vermis tenacitate repeterem, quae olim cum humanis finnis institui <sup>3)</sup>. Antequam igitur ad descriptionem partium accedam, breuiter de his sermonem faciam.

Nunc scilicet aqua frigida, vel feruescente, nunc vulgari frumenti spiritu, nunc aliis liquoribus salinis hos enecare studui vermes, h. e. operam adhibui, ne finnae, quae in hisce fluidis caput, collum atque corpus in vesica absconderant, has partes amplius exfererent. Sed non raro mihi accidit, vt plures, nisi omnes, quae in illis fluidis in sese quasi ipsas,

E 5

retra-

2) Vid. l. c.

3) Vid. hui. tract. *Continuat. secund. pag. 54. seqq. not. B. B.*

retractae erant, in vitam reuocarem, id est, ope varii caloris gradus effeci, ut suas interiores partes denuo longe lateque protenderent. Tales nunc enecatos, nunc resuscitados vermes possideo exsertos in collectione mea. Quodsi vero spiritu vini fortiori illos submergebam, paulo post rigidos et immobiles factos esse, videbam. Idemque et iis accidebat, quos per aliquot temporis intervallum in solutionibus salinis saturatis conseruavi. Quae res cum, et has finnas eadem tenaci vita, ut humanas, uti, probaret, summam in me admirationem excitauit. Sed iam olim<sup>b)</sup> internarum partium huius taeniae aequae exsertionem ac retractionem incertum dubiumque vitae signum esse, utramque a vi forte physica, non vero vitali dependere suspicatus sum. Nunc, nisi egregie fallor et omnis obseruationculis his deneganda fides est, experimentis et in his vermibus institutis, illam non prorsus vanam neque temerariam fuisse opinionem edoctus scio. Vidi enim, cum finnas flaccidas et per aliquot dies aëri expositas leniter, calente aqua superfunderem, feri vesica interna contentam copiam forte ob porosam huius partis structuram augeri vesicamque admodum expandere. Sic versa vice copiam illam minui et vesicam corrugescere obseruavi, si vermes vel aqua frigida vel aliis liquoribus constringentibus submersi. Quo igitur gradu serum auctum et vesicam expansam vidi, eodem finna in se ipsam quasi

b) Vid. *Contin. secund. p. 54. seqq.* N. E. B.

trahi retracta, expandente vi physica exteriora versus  
 protrudebatur: contra ea quo gradu feri copia minue-  
 tur, eodem retrahebatur finna. Tali modo cau-  
 sam et originem tenacis vitae obseruavi atque mecha-  
 nicam esse intellexi. Mihi nunc intellectu facile erat,  
 cur non omnes resuscitatae fuerint finnae, quas prae-  
 tertim fortiori spiritu vini superfundebam. Etenim  
 ut parum aut nihil illius feri in vesica interna aderat;  
 expandi igitur vesica et finna protrudi non poterat;  
 vel spissum et coagulatum quasi et rigidum animal est  
 spiritu vini quasi caustico redditum. Caeterum libens  
 libensque concedo, adhuc alias a me praeteruisas  
 cuius rei adesse posse causas, sed illas esse vitales,  
 omnino nego.

At hoc in transitu dixerim. Propius nunc ad  
 alias partes, quas et Experient. KÜHNIVS, quem vti-  
 lim praeceptorem, ita nunc amicum habeo, mecum  
 armato oculo vidit, scilicet ad corpus vermis, collum  
 et caput accedo.

Quas partes, cum taenia ab interiore exteriora  
 versus exserit, corpus in oculos inuestigatoris pri-  
 mum incurrit. Quod obtusi conii speciem prae se  
 fert <sup>c)</sup>. Basi sua cum vesica interna cohaeret et apice  
 versus collum spectat. Male hanc partem Cel. FABRI-  
 CIVS <sup>d)</sup>, et GOETZIVS <sup>e)</sup> descripserunt atque depinx-  
 erunt.

c) Vid. *Tab. V. Fig. 8. bb.*

d) Vid. *l. c. Fig. 4. ee.*

e) Vid. *l. c.*

runt. Quorum ille quidem formam eius externam bene expressit, sed in eo peccauit, vt putaret, corpus vtriculo haud dissimile esse. Inde factum est, vt vesica interna collapsam tamquam prolongatum corpus delinearet et duas has diuersas partes pro vna eademque haberet. Goetzius vero adhibito infelici instrumento pressorio (*Pressschieber*) illud sic deformauit, vt cylindro magis, quam cono simile sit. Inde quoque factum est, vt extrema eius pars obtusa plane desit. Quapropter singularem operam dedi, vt tale depingerent, quale, dum viuit vermis, obseruauerim <sup>f</sup>). A collo maiori crassitie et numerosioribus incisuris differt. Et inuenient Lectores <sup>g</sup>), quomodo cum vesica interna cohaereat. Etenim hic loci summo cum studio acuum ope expansam delineavi, vt habeant certissimos haud corporis partem esse vtercularem. Exserto corpore collum progreditur <sup>h</sup>). Longitudine tertiam corporis partem aequat. Tenuius illo leuiusque rugosum est. Quas rugas ob subtiliorem structuram non depingere potui. Cel. FABRICIUS <sup>i</sup>) vt equidem puto, longius et quoad corporis structuram tenuius; GÖRTZIUS <sup>k</sup>) vero latius et nimis incisum repraesentare studuit.

Vt in limace acini sensorii, sic in hac taenia caput vltimo loco venit. Cel. GOETZIUS <sup>l</sup>) egregie partes

f) Vid. *Tab. V. Fig. 8. ee. ff.*

g) Vid. *l. c.*

h) Vid. *l. c. dd.*

i) Vid. *l. c.*

k) Vid. *l. c.*

l) Vid. *l. c.*



artes illo contentas, figuram autem, eius externam aptissime iconē expressit FABRICIVS <sup>m)</sup>).

Quatuor praeditum est papillis fugentibus <sup>n)</sup>, quibus originem ducunt totidem canales <sup>o)</sup>, quos ab lente optica, cuius focus tres lineas aequabat, ad profundiores corporis partes serpere vidimus. Vnum ex his vt primum in corpus intrauerat, angustum anteriora et amplum posteriora versus obseruauimus <sup>p)</sup>, tumque a finna ex arbitrio aut diduci, aut contrahi posse, ea de causa sum suspicatus. Coronam duplici hamulorum serie praeditam non tam egregie, vt a Del. GOETZIO factum est <sup>q)</sup>, obseruare potui. Singulos tantum in vicinitate capitis obscure vidi hamulos <sup>r)</sup>. Aut retracti erant, aut praestantiori mea lene vir ille vsus est, aut quod omnium verosimillimum videtur, caput finnae in meis experimentis semper ita collocabatur, vt illi hamuli versus inferiora spectarent. Sed haec satis dicta sunt, cum reliqua, quae ad hunc vermem pertinent, in illorum virorum scriptis inueniant Lectores.

Caeterum ex his satis elucet, finnam in carne suis inuentam, aut parum, aut nihil ab humana differre, neque multum abest, quin ego has pro vna eademque habeam vermis intestinalis speciei. Harum igitur comparisonem alibi <sup>s)</sup> institutam his obseruationibus rite factis, omnino finio.

m) Vid. l. c.

n) Vid. l. c. Fig. p. cc.

o) Vid. l. c. Fig. p. i. g. i.

p) Vid. l. c. g.

q) Vid. l. c. r) Vid. l. c. bb.

s) Vid. Contr. sec. p. 50.

## EXPLICATIO TAB. V.

Finnam tabula haec in suis carne nuper inuentam eiusque partes interiores diuersa magnitudine maxima ex parte viuas repraesentat.

*Fig. 1.* Naturali magnitudine finnam emortuam repraesentat. Vesica eius interna laesa est et in duo lobos collapsa.

*a.* Corpusculum subrotundum, finna in sese quasi retracta.

*bb.* Duae vesicae collapsae extremitates, lobos constituentes.

*Fig. 2.* Idem vermis est. Duo lobi

*bb.* magis, quam in antecedente figura inferiora versus dependent.

*Fig. 3.* Idem vermis est. At vnum tantum lobum *b.* efformat vesica collapsa.

*Fig. 4.* Taenia integra est, in vesica fero repleta residens.

*a.* Finna retracta.

*bb.* Duae vesicae extremitates.

*Fig. 5.* Eadem finna in naturali magnitudine, antecedente vero maior.

*a.* Finna retracta. Hic loci manifesto apparet incisura quaedam, e qua egreditur vermis.

*bb.* Duae vesicae extremitates.

*Fig. 6.* Taenia microscopio paululum aucta. Loco illius incisurae eminentiam, id est, progredi incipientem vermem habent Lectores.

*a.* Progrediens vermis.

*bb.* Duae

Fig. 8.

Fig. 2.




Fig. 5.

Fig. 4.



Fig. 7.

Fig. 6.



Fig. 1.



Fig. 9.







*bb.* Duae vesicae extremitates.

*Fig. 7.* Idem vermis, antecedente vero magis exsertus.

*Fig. 8.* Finna lentis opticae ope satis aucta. Integra est, at vesica eius destructa et collapsa.

*a.* Anterior capitis pars attenuata.

*bb.* Corona multis hamulis praedita (*Hackenkrantz*)

*cc.* Quatuor papillulae fugentes, vel quod idem est, os quadruplex.

*dd.* Collum tenuius incisum.

*ee.* Corpus multis incisuris exornatum.

*ff.* Incisurae ipsae.

*gg.* Vesica interna collapsa et acum ope expansa.

*Fig. 9.* Finnae caput, collum et anterior corporis pars admodum lente, cuius focus tres lineas aequabat, aucta. Distincte satis animaduertitur

*a.* Attenuata capitis pars.

*bb.* Hamulorum corona.

*cc.* Orificia oris quatuor.

*d.* Posterior capitis pars,


*e.* Collum.

*f.* Corporis initium.

*g. ii.* Quatuor canales ab orificiis illis *c. c.* incipientes.

# ERRATA.

Pag. 1. lin. 5. quislibet, leg. quilibet. Pag. 2. l. 26.  
 l. hospitum. Pag. 3. l. 8. l. in peius l. 15. l. sequentibus.  
 Pag. 4. l. 5. l. eum e. l. 8. fines amplificarunt. l. 19. l. ini-  
 tium. Pag. 5. l. 4. del. in. l. 17. l. noxiar. Pag. 7. l. 4.  
 l. de cuius. Pag. 9. l. 10. l. America. l. 13. del. cum. Pag. 10.  
 lin. 21. l. 1. fetam. l. 25. l. tegant. Pag. 11. lin. 12. l. conii-  
 ciant. Pag. 12. lin. 23. l. contigerat. Pag. 13. l. 13.  
 l. Modeero. Pag. 15. l. 22. l. consuluerit lin. 23. l. fines.  
 Pag. 17. lin. 20. l. quieto in. lin. 28. l. ad maximam.  
 Pag. 19. lin. 11. l. sinistro. Pag. 20. lin. 1. l. ad secun-  
 dam. lin. 3. l. ad deriuandam. Pag. 22. lin. 9. l. adspectum.  
 Pag. 24. lin. 23. l. mutare. Pag. 28 lin. 4. l. vis ac robur.  
 lin. 18. l. aucta sunt. Pag. 30. lin. 20. l. quos. Pag. 31.  
 lin. 15. l. pro denique, tandem. Pag. 32. lin. 18. l. facile.  
 Pag. 34. lin. 1. l. eodem. Pag. 35. lin. 24. l. basi alta.  
 Pag. 41. lin. 21. l. totum gregem. Pag. 43. lin. 7. l. an-  
 nuum Pag. 47. lin. 27. l. appellare liceat. Pag. 49. lin. 1.  
 l. leuandam. lin. 26. l. et eundem. Pag. 50. lin. 6. l. co-  
 haerere. Pag. 51. lin. 11. l. ad terram.









TIGHT  
GUTTERS